

Крок М. Лікувальна справа-2013

1 Фельдшер ШМД доставив хворого з підозрою на внутрішню кровотечу внаслідок розриву селезінки. Групу крові визначили за допомогою цоліклонів анти-А та анти-В. Через 2,5-3 хвилини оцінили результат: реакція аглютинації відбулась з цоліклоном анти-А, з анти-В відсутня. Яка група крові у хворого?

- A. *A(II)
- B. АВ(IV)
- C. Помилка при визначенні групи
- D. 0(I)
- E. B(III)

2 У пацієнта 32-х років на тлі гіперемованої шкіри в ділянці вусів дрібні гноячки, жовті кірки, свербіж, збільшені підщелепні лімфатичні вузли. Яку патологію варто запідозрити?

- A. Герпес простий
- B. *Сикоз
- C. Туберкульоз шкіри
- D. Трихофітія
- E. Кандидоз

3 До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 42-х років із скаргами на нападоподібний кашель з незначним виділенням слизисто-гнійного харкотиння, яке тяжко відкашлюється, задишку. Об'єктивно: діжкоподібна грудна клітка, аускультативно - сухі свистячі хрипи при форсованому видосі. Про яке захворювання можна думати?

- A. Гострий бронхіт
- B. Сухий плеврит
- C. Ексудативний плеврит
- D. *Хронічний обструктивний бронхіт
- E. Негоспітальна пневмонія

4 На виробництві робітник отримав рану грудної клітки. Скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, різкий біль в місці ушкодження, задишку, кашель. Об'єктивно: шкірні покрови бліді, АТ- 70/60 мм рт.ст. В ділянці рани чути хлюпотіння. Про наявність якого невідкладного стану свідчать ці ознаки?

- A. Кардіогенний шок
- B. *Відкритий пневмоторакс
- C. Закритий пневмоторакс
- D. Перелом ребер
- E. набряк легенів

5 Дитина народилась недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту призначенням відеїну. Визначте початок та добову дозу призначення вітаміну D₃:

- A. На 2-му тижні по 4000 МО
- B. *З 10-14-го дня по 500-1000 МО
- C. На 2-му місяці життя по 500 МО
- D. З 10-го дня по 2000 МО
- E. З 10-20-го дня по 1000-2000 МО

6 У хворого 32-х років сечокам'яна хвороба. Дієти не дотримується. Фельдшером ШМД госпіталізований з нирковою колькою та затримкою сечі. Яку першу медичну допомогу потрібно надати пацієнту?

- A. Поставити холодний компрес на гомілки
- B. Провести катетеризацію
- C. Поставити гірчичники на гомілки
- D. *Помістити в гарячу ванну
- E. Помістити в прохолодну ванну

7 На ФАП звернувся хворий 57-ми років, працює бурильником. Скаржиться на ниючий біль у кистях, який турбує уночі, відчуття "повзання мурашок", мерзлякуватість кистей, головний біль, поганий сон, зниження працездатності. Крім того, зазначає побіління пальців після миття рук холодною водою. Яке захворювання можна запідозрити?

- A. Діабетична полінейропатія
- B. *Вібраційна хвороба
- C. Інтотоксикаційна полінейропатія
- D. Реактивний артрит
- E. Синдром Рейно

8 Фельдшер на виклику у заміжньої жінки, яка скаржиться на періодичні переймоподібні болі у здухвинній ділянці, затримку менструації. Після фізичного навантаження з'явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина?

- A. Прогресуюча позаматкова вагітність
- B. Перекрут ніжки кісти
- C. Розрив піосальпінксу
- D. Апоплексія яєчника
- E. *Порушена позаматкова вагітність

9 Фельдшер швидкої допомоги транспортує до стаціонару пацієнтку, в якій почалося блювання у вигляді "кавової гущі". Яку невідкладну допомогу потрібно надати пацієнтці?

- A. Застосувати теплу грілку
- B. Посадити пацієнтку
- C. Дати випити теплого чаю
- D. *Покласти на епігастральну ділянку міхур з льодом
- E. Промити шлунок

10 Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта, який скаржиться на кашель з виділенням вранці гнійного харкотиння з неприємним запахом (до 200 мл), підвищення температури тіла до 37,8°C. При огляді пальці мають вигляд "барабаних паличок", а нігті "годинникових скелець". Про яке захворювання можна думати?

- A.** Плеврит
- B.** Пневмоконіоз
- C.** Пневмонія
- D.** *Бронхоектатична хвороба
- E.** Туберкульоз

11 Дитині 3 роки. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C, слабкість, розлади сну, погіршення апетиту, часті та болісні сечовипускання, нетримання сечі. Сеча каламутна, з осадом і пластівцями. Першочерговим дослідженням у комплексі діагностичних заходів буде:

- A.** Мікційна цистографія
- B.** Рентгеноурологічне
- C.** Екскреторна урографія
- D.** Цистоскопія
- E.** *УЗД нирок

12 При обстеженні хворого фельдшер ФАПУ знайшов симптоми гострого гастриту, які з'явилися у хворого після тривалого вживання низки фармакологічних препаратів. Який з препаратів здатний спричинити такі симптоми?

- A.** Но-шпа
- B.** *Вольтарен
- C.** Сенаде
- D.** Корвалол
- E.** Валеріана

13 Фельдшера ШМД викликали до хворого 42-х років у якого спостерігаються відчуття голоду, загальна слабкість, виражена вологість шкірних покривів, тремор кінцівок, гіперкінезія. Через декілька хвилин пацієнт знепритомнів. Зіниці розширені, тонус очних яблук збережений, дихання часте, поверхнєве. В анамнезі: цукровий діабет. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A. Гіпертензивний криз
- B. Гіперглікемічна кома
- C. Напад бронхіальної астми
- D. Напад стенокардії
- E. *Гіпоглікемічна кома

14 На ФАПі закінчився 3% розчин хлораміну для дезінфекції інструментарію. Скільки хлораміну необхідно взяти для приготування 2 л 3% розчину хлораміну?

- A. 90 г
- B. 20 г
- C. 40 г
- D. 30 г
- E. *60 г

15 У дитини 8-ми місяців виникла раптова зупинка дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом, "півнячий крик". З чого слід розпочати надання невідкладної допомоги?

- A. Ввести підшкірно 1% р-н нікотинової кислоти
- B. Зробити прохолодну клізму
- C. *Натиснути на корінь язика
- D. Ввести внутрішньом'язово 50% р-н анальгіну
- E. Ввести внутрішньовенно преднізолон

16 У хворої 44-х років, що страждає на хворобу Верльгофа, періодично

з'являються плямисті геморагії на шкірі і посилюються маткові та носові кровотечі. Що стало найбільш імовірною причиною даного захворювання?

- A. *Порушення тромбоцитопоезу
- B. Дефіцит вітаміну E
- C. Дефіцит вітаміну A
- D. Порушення лейкопоезу
- E. Порушення еритропоезу

17 В цеху на підприємстві працівник 32-х років 15 хвилин тому поранив ліве передпліччя. З рани фонтаном витікає кров яскраво-червоного кольору. Стан хворого середньої важкості, Рs- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Які першочергові дії фельдшера при наданні невідкладної допомоги?

- A. Накласти міхур з льодом на рану
- B. Провести тугу тампонаду рани
- C. Лігувати судину в рані
- D. Накласти тугу стискаючу пов'язку на рану
- E. *Накласти артеріальний джгут Есмарха на нижню третину плеча

18 До фельдшера ФАПу терміново звернувся хворий, якого вжалила за губу бджола. Скаржить на ядуху, нудоту, гавкаючий кашель. Об'єктивно: обличчя набрякле, шкіра блідо-ціанотична, дихання утруднене, осиплість голосу, артеріальний тиск у нормі. Фельдшер може запідозрити у хворого:

- A. Гострий алергічний риніт
- B. *Набряк Квінке
- C. Напад бронхіальної астми
- D. Кропивницю
- E. Анафілактичний шок

19 У дитини 7-річного віку астенічної конституції спостерігаються підвищена нервова збудливість, надмірна вразливість, енурез, періодично виникають напади ацетонемічного блювання. Для якого захворювання

характерні дані симптоми?

- A. Ексудативно-катаральний діатез
- B. *Нервово-артритичний діатез**
- C. Алергічний діатез
- D. Геморагічний діатез
- E. Лімфатико-гіпопластичний діатез

20 Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на предмет залишків миючого засобу фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства здійснює за допомогою такого методу:

- A. Азопірамовий
- B. Амідопіриновий
- C. Бензидиновий
- D. *Фенолфталеїновий**
- E. Ортогулоїдиновий

21 Фельдшера викликали в цех з приводу нещасного випадку. Зі слів робітників, їх товариш, який працював з електричним обладнанням, крикнув, впав, почалися судоми. До моменту приходу фельдшера судоми припинились. Об'єктивно: затиснутий в руці оголений електричний провід, що звисає зі станка. Свідомість відсутня. Шкіра бліда. Зіниці на світло не реагують. Першочерговість дій фельдшера:

- A. Дати вдихнути нашатирний спирт
- B. Знеболити, транспортувати до хірургічного відділення
- C. Дефібриляція
- D. Ввести протигістамінні препарати
- E. *Припинити дію струму, розпочати серцево-легеневу реанімацію**

22 На ФАПі спостерігається першовагітна 20-ти років з анатомічно звуженим тазом II ступеня. В який термін вагітності необхідно її госпіталізувати в пологовий будинок?

- A. У разі злиття навколоплідних вод
- B. 35-36 тижнів
- C. 39-40 тижнів
- D. З початком пологової діяльності
- E. *37-38 тижнів

23 У дівчинки 1,5 років вологий кашель, задишка з утрудненим видихом, ЧДР- 45/хв, дистанційні хрипи. Аускультативно - різнокаліберні вологі та свистячі сухі хрипи. Який препарат найдоцільніше ввести дитини?

- A. Цифран усередину
- B. Ампіцилін в/м
- C. *Розчин еуфіліну в/в
- D. Розчин седуксену в/м
- E. Розчин строфантину в/в

24 Фельдшер ФАПУ спостерігає за осередком туберкульозної інфекції. Дитині 10-ти років проведена туберкулінова проба Манту. Які результати свідчать про позитивну пробу у дитини?

- A. *Папула 6 мм
- B. Папула 20 мм
- C. Гіперемія 5 мм
- D. Папула 3 мм
- E. Гіперемія 10 мм

25 До фельдшера ФАПУ звернулась жінка 22-х років зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 39,5°C. Об'єктивно: ЧСС- 108/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст., живіт помірно здутий, різко болючий у гіпогастральній ділянці. Симптом Щоткина-Блюмберга позитивний у гіпогастрії. Піхвове обстеження: матка та додатки не пальпуються внаслідок напруження передньої черевної стінки, заднє склепіння піхви нависає, різко болісне. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гострий ендометрит
- B. Позаматкова вагітність
- C. *Пельвіоперитоніт
- D. Апоплексія яєчника
- E. Гострий аднексит

26 Пацієнтка 19-ти років скаржиться на появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння у зовнішніх статевих органах і піхві, болісність при сечовипусканні. Об'єктивно: слизова оболонка піхви набрякла, гіперемована. Призначено взяття мазка для бактеріоскопічного дослідження. Вкажіть місце взяття мазка:

- A. *Заднє склепіння піхви
- B. Цервікальний канал
- C. Анальний отвір
- D. Уретра
- E. Бокове склепіння піхви

27 У дитини 8-ми років важкий загальний стан, спостерігається системне ураження лімфатичних вузлів, збільшені печінка і селезінка. Які показники аналізу крові супроводжують такий стан?

- A. Пойкілоцитоз
- B. Лейкоцитоз
- C. Еозинофілія
- D. *Лейкемічний провал
- E. Зсув лейкоцитарної формули вліво

28 У дитини 2-х років температура 38°C, кволість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Ці симптоми свідчать про наявність у дитини такого захворювання:

- A. Назофарингіт
- B. Бронхіальна астма

- C. Гострий ларингіт
- D. *Гостра пневмонія
- E. Гострий бронхіт

29 До пацієнтки 20-ти років, яка страждає на наркоманію, виїхала бригада ШМД. Об'єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадикардное, брадикардія. Що терміново показано хворій?

- A. Інфузійна терапія
- B. Призначення налорфіну
- C. Форсований діурез
- D. Оксигенотерапія
- E. *ШВЛ

30 У дівчинки 10-ти років після фізичного навантаження, вживання жирної та смаженої їжі виникає неінтенсивний ниючий біль у ділянці правого підребер'я, що супроводжується нудотою, гіркотою в роті. Яке захворювання можна запідозрити?

- A. Виразкова хвороба шлунка
- B. *Дискінезія жовчних шляхів
- C. Ентерит
- D. Хронічний гастрит
- E. Коліт

31 Фельдшер ФАПУ проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Де він повинен покласти стетоскоп при першій позиції поперечного положення плоду?

- A. Справа нижче пупка
- B. Справа вище пупка
- C. *Зліва на рівні пупка
- D. Зліва нижче пупка

Е. Справа на рівні пупка

32 У хворої 24-х років на другий день після підшкірного введення 2 мл 20% олійного розчину камфори з'явилися біль і ущільнення в ділянці ін'єкції. Яке ускладнення у хворої?

- А.** Некроз
- В.** Абсцес
- С.** Гематома
- Д.** Алергійна реакція
- Е.** *Інфільтрат

33 До ФАПу звернулась жінка зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого передпліччя і кисті, які виникли після використання нового прального порошку. Об'єктивно: шкіра кисті та передпліччя гіперемована, набрякла, папульозні і везикулярні висипи. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Псоріаз
- В.** Нейродерміт
- С.** Токсикодермія
- Д.** *Алергічно-контактний дерматит
- Е.** Піодермія

34 У хворого 50-ти років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль у епігастральній ділянці та правому підребер'ї, який супроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Об'єктивно: Рс- 100/хв., аритмічний, екстрасистоля. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Пальпаторно: розлите напруження і болючість верхньої половини черевної стінки. Лейкоцитоз - $13,8 \cdot 10^9$ /л. ЕКГ - інтервал ST у відведеннях III та aVF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розвинулась у хворого?

- А.** Перфорація виразки шлунку
- В.** Харчова токсикоінфекція
- С.** Гострий панкреатит

D. *Гострий інфаркт міокарда

E. Гострий холецистит

35 При обстеженні пацієнтки виникла підозра на непрохідність маткових труб. Яке дослідження може це підтвердити?

A. Кольпоскопія

B. Пункція заднього склепіння

C. Зондування матки

D. Вишкрібання слизової оболонки матки

E. *Гістеросальпінгографія

36 Оглядаючи жінку з терміном вагітності 26 тижнів, фельдшер ФАПу діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

A. Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг

B. Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрію хлориду

C. Внутрішньовенно гініпрал

D. *Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг

E. Сублінгвально ніфідипін

37 На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?

A. Бешиха

B. Лімфангоїт

C. *Лімфаденіт

D. Флегмона

E. Правець

38 На ФАП доставлений хворий у стані алкогольного сп'яніння, який тривалий час пролежав на вулиці у снігу. Об'єктивно: температура тіла знижена до 31-30°C, шкіра холодна, мармурово-ціанотична, відсутність міміки, безглуздий погляд потерпілого. Рс- 32/хв., слабкого наповнення. АТ-100/60 мм рт.ст. ЧД- 8/хв., поверхневе. Температура в прямій кишці знижена 28-30°C. Який ступінь замерзання у хворого?

A. *II

B. III

C. V

D. I

E. IV

39 У дитини після гри з кішкою на волосистій ділянці голови виникло вогнище, вкрите дрібними лусочками. Волосся повністю обламане на висоті 3-5 мм над рівнем шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

A. *Мікроспорія

B. Парша

C. Себорейна екзема

D. Поверхнева трихофітія

E. Псоріаз

40 До ФАПу звернувся потерпілий, який декілька днів тому отримав відмороження ступнів. При обстеженні пацієнта спостерігається некроз усіх шарів шкіри, утворюються пухирі з кров'янистим вмістом. Який це ступінь відмороження?

A. II

B. I

C. *III

D. IV

E. III б

41 На ФАП звернулася 34-річна жінка зі скаргами на затримку менструації на 1,5 місяця і кров'янисті виділення з піхви. В анамнезі одні пологи. При гінекологічному обстеженні: шийка "бочкоподібна", матка в anteflexio, тіло матки маленьке. Шийка матки розміром з жіночий кулак, цервікальний канал пропускає палець. Придатки не пальпуються. Виділення кров'янисті, густі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Трубна вагітність
- B. Ерозія шийки матки
- C. *Шийкова вагітність
- D. Рак шийки матки
- E. Аборт у ходу

42 Під час огляду хворого виявлено: набряк рогівки, спазм повік, слезотеча, світлобоязливість, зниження гостроти зору; зіниця неправильної форми, колір її змінений. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. Гострий напад глаукоми
- B. Гострий кон'юнктивіт
- C. *Гострий поверхневий кератит
- D. Трахома
- E. Гострий іридоцикліт

43 Фельдшера ФАПу викликали до хворої. Родичі повідомили, що 2 години тому в хворої відмічалась слабкість правої руки і правої ноги, зник голос. Хвора обстежена фельдшером, який патології нервової системи не виявив. Як називається таке порушення мозкового кровообігу?

- A. Ішемічний інсульт
- B. Геморагічний інсульт
- C. Тромбоемболія судин мозку
- D. *Транзиторна ішемічна атака
- E. Субарахноїдальний інсульт

44 У роділлі фізіологічний перебіг післяпологового періоду, друга доба. Вкажіть характер лохій, що відповідатимуть даній ситуації:

- A. Серозно-кров'янисті
- B. Серозні
- C. Гнійні
- D. Прозорі
- E. *Кров'янисті, в помірній кількості

45 У пацієнта 45-ти років спостерігається ранкова скутість у дрібних суглобах кистей рук. Об'єктивно: суглоби деформовані ("ласти моржа"), шкіра над ними набрякла та гіперемована. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Ревматичний артрит
- B. Гонорейний артрит
- C. Деформуючий артроз
- D. Хвороба Бехтерева
- E. *Ревматоїдний артрит

46 На прийомі у фельдшера ФАПУ мати із дівчинкою 7 місяців. Дитина перебуває на грудному вигодовуванні. Профілактика рахіту не проводилась. Фруктово-овочеві продукти, соки не отримує. При об'єктивному обстеженні виражені лобні і тім'яні бугри. Велике тім'ячко має розмір 3х3 см, краї його потовщені, на ребрах чотки, виражена м'язова гіпотонія, симптом "жаб'ячого" живота. Дитина погано спирається на ніжки. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. Рахіт II, гострий перебіг
- B. *Рахіт II, підгострий перебіг
- C. Рахіт I, гострий перебіг
- D. Гіпотрофія II ступеня
- E. Гіпотрофія I ступеня

47 Пацієнту 70-ти років з аденомою передміхурової залози необхідно промивати постійний катетер Померанцева. Який розчин повинен використати фельдшер з метою запобігання висхідної інфекції?

- A. *Фурациліну 1:5000
- B. 0,9% натрію хлориду
- C. 6% перекису водню
- D. 2% гідрокарбонату натрію
- E. 3% перекису водню

48 У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Що із переліченого є першочерговим при наданні невідкладної допомоги?

- A. *Ввести роторозширювач та зафіксувати язик
- B. Дати наркоз
- C. Дати кисень
- D. Ввести еуфілін
- E. Виміряти артеріальний тиск

49 Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 53-х років, який скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до 39,2°C, кашель із виділенням іржавого харкотиння, болі в нижній частині грудної клітки справа, які посилюються при кашлі, задишці. Об'єктивно: шкіра обличчя гіперемована, синюшність носогубного трикутника. ЧД- 46/хв. В легенях справа у підлопатковій ділянці: притуплений перкуторний звук; аускультативно - дихання з бронхіальним відтінком, вологі дрібнопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Трахеїт
- B. Плеврит
- C. Бронхіт
- D. Вогнищева пневмонія
- E. *Крупозна пневмонія

50 До ФАПу звернувся хворий 55-ти років зі скаргами на порушення акту дефекації останні 6 місяців. Проноси чергуються із закрепами, незначна кровотеча. В останні дні з'явився біль у промежині. Помітно втратив вагу. Під час пальцевого дослідження фельдшер виявив горбисте ущільнення, малорухоме під час пальпації. Який попередній діагноз?

- A.** Конділома прямої кишки
- B.** *Рак прямої кишки
- C.** Тріщина прямої кишки
- D.** Поліп прямої кишки
- E.** Геморой

51 Під час огляду новонароджена дитина млява, адинамічна, природжені рефлекси знижені, крик "мозковий", спостерігається тремор, ністагм, випинання великого тім'ячка. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Пневмонія
- B.** Гемолітична хвороба новонароджених
- C.** Фізіологічна жовтяниця
- D.** *Внутрішньочерепна пологова травма
- E.** Сепсис новонароджених

52 Фельдшер ШМД госпіталізував хвору 64-х років із матковою кровотечею і анемією. Після 12-річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку виникли серозно-водянисті виділення з піхви, потім серозно-кров'янисті, за типом "м'ясних помиїв", з'явилися болі внизу живота. Яка патологія найбільш імовірна?

- A.** Хоріонепітеліома
- B.** *Рак матки
- C.** Внутрішній генеральний ендометріоз
- D.** Неповний аборт
- E.** Міхуровий занесок

53 Чоловік 22-х років скаржиться на головний біль, тупий біль у попереку. Тиждень тому переніс ангіну. Об'єктивно: обличчя одутле, сеча кольору "м'ясних помий", АТ- 160/110 мм рт.ст. Прийом бісептолу стан не поліпшив. Діагноз: гострий гломерулонефрит. Які дії фельдшера?

- A. Патогенетична терапія, залишити вдома
- B. Сульфаніламідні, залишити вдома
- C. Симптоматична терапія, залишити вдома
- D. Антибіотики, залишити вдома
- E. *Госпіталізація

54 До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 30-ти років зі скаргами на остуду, відчуття голоду, неспокій. В анамнезі: пацієнт страждає на цукровий діабет 1-го типу. Об'єктивно: пацієнт збуджений, шкіра тепла, профузний піт, неадекватна поведінка. Рівень глюкози у крові 2,0 ммоль/л. Назвіть першочергові заходи невідкладної допомоги:

- A. Внутрішньовенне краплинне введення 200 мл 0,9% розчину натрію хлориду
- B. Підшкірне введення 40 ОД інсуліну
- C. *Внутрішньовенне струминне введення 40-60 мл 40% розчину глюкози
- D. Внутрішньовенне струминне введення 5 мл 40% розчину глюкози
- E. Внутрішньовенне струминне введення 40-60 мл 5% розчину глюкози

55 На ФАП звернувся пацієнт, прооперований у хірургічному відділенні місяць тому з приводу перфоративної виразки 12-палої кишки. Скарги на різкі нападоподібні болі у животі, які тривають близько години, багаторазове блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт під час нападу. Живіт м'який, болісний у всіх відділах. Випорожнень не було. Яке найбільш імовірно ускладнення виникло?

- A. Абсцес черевної порожнини
- B. *Спайкова кишкова непрохідність
- C. Метеоризм
- D. Перитоніт
- E. Рецидив виразкової хвороби 12-палої кишки

56 У роділлі 30-ти років через 10 хвилин після народження дитини з'явилися переймоподібні болі внизу живота, бажання тужитися, затискач, накладений на пуповину біля статевої щілини, зміщується донизу, з піхви виділилось 100 мл крові. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** *Третій період нормальних пологів
- B.** Гіпотонія матки
- C.** Справжнє прирощення плаценти
- D.** Щільне прикріплення плаценти
- E.** Затримка плаценти в порожнині матки

57 До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік, який скаржиться на загальну слабкість, безсоння, схуднення, гемороїдальні кровотечі. Шкіра жовтянича. На шкірі живота "голова медузи". Асцит. На ногах набряки. Добовий діурез - 500 мл. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

- A.** Хронічний гепатит
- B.** *Цироз печінки
- C.** Хронічний холецистит
- D.** Хронічний панкреатит
- E.** Хронічний ентерит

58 При дослідженні пульсу у тяжкохворого фельдшер визначив, що його частота дорівнює 50/хв. Як оцінити таку частоту пульсу?

- A.** Пароксизмальна тахікардія
- B.** Ниткоподібний
- C.** *Брадикардія
- D.** Тахікардія
- E.** Аритмія

59 Фельдшер ФАПУ, прибулий на місце події, діагностував у потерпілого 28-ми років відкритий перелом кісток тазу з ушкодженням сечового міхура. З

чого слід почати невідкладну допомогу?

- A. Введення знеболюючих засобів
- B. Накладання асептичної пов'язки
- C. Транспортна іммобілізація
- D. Проведення туалету рани
- E. *Катетеризація сечового міхура

60 У пацієнта 18-ти років, що хворіє на ревматизм з мітральним стенозом, після гри у футбол з'явилися задишка, виділення рожевого пінистого харкотиння. Об'єктивно: над легенями вислуховуються дрібно- та середньопухирчасті вологі хрипи. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A. Гостра судинна недостатність
- B. *Гостра лівошлуночкова недостатність
- C. Шлунково-кишкова кровотеча
- D. Легенева кровотеча
- E. Гостра дихальна недостатність

61 Фельдшер ФАПУ обстежує дитину на 5-й день хвороби з попереднім діагнозом ГРВІ. Стан хлопчика погіршився за рахунок посилення кашлю, нежиттю та появи плямисто-папульозного висипу спочатку за вухами, потім на шкірі тулуба і кінцівок. Яке захворювання відповідає перерахованим симптомам?

- A. Вітряна віспа
- B. Скарлатина
- C. Менінгококова інфекція
- D. *Кір
- E. Краснуха

62 До пацієнтки 45-ти років, яка скаржиться на головний біль у ділянці потилиці, нудоту, одноразове блювання, що з'явилися після сварки з чоловіком, викликали фельдшера ФАПУ. Об'єктивно: збудження, червоні

плями на обличчі, шиї, Рс- 110/хв., АТ- 180/110 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

- А. Напад стенокардії
- В. Інфаркт міокарда
- С. *Гіпертонічний криз I типу
- Д. Гіпертонічний криз II типу
- Е. Харчове отруєння

63 При виконанні фельдшером швидкої допомоги внутрішньовенного вливання 10% розчину кальцію хлориду пацієнт 53-х років відчув пекучий біль у місці ін'єкції. Що повинен зробити фельдшер?

- А. *Обколоти місце ін'єкції 0,5% розчином новокаїну
- В. Обколоти місце ін'єкції 2,4% розчином еуфіліну
- С. Ввести у місце ін'єкції 0,1% розчин адреналіну
- Д. Прикласти міхур з льодом
- Е. Вище місця ін'єкції накласти джгут

64 Фельдшеру швидкої допомоги надійшов виклик до хлопчика 4-х років. Об'єктивно: загальний стан порушений, дитина млява, неспокійна, температура тіла 39,7°C, ЧД- 32/хв., ЧСС- 140/хв. На шкірі спини, сідниць, стегнах, гомілках спостерігаються геморагічні висипання неправильної "зірчастої" форми з некрозом в центрі. Яку невідкладну допомогу необхідно надати на догоспітальному етапі?

- А. Ввести піпольфен, бензилпеніцилін, строфантин
- В. Ввести анальгін, димедрол, дексаметазон
- С. Ввести супрастин, парацетамол, цефтріаксон
- Д. *Ввести левоміцетин, преднізолон, анальгін
- Е. Ввести сибазон, лазикс, парацетамол

65 Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта, який скаржиться на біль

у ділянці серця стискаючого характеру з іррадіацією в ліве плече, лопатку. Біль триває 5 хвилин. Для невідкладної допомоги фельдшер використає в першу чергу:

- A. Димедрол
- B. *Нітрогліцерин
- C. Преднізолон
- D. Еуфілін
- E. Натрію хлорид

66 Ви фельдшер ФАПу даєте поради по годуванню дитини 6-ти місяців з функціональним розладом травлення після водно-чайної паузи. Скільки разів на добу доцільно годувати дитину?

- A. 5
- B. 10
- C. 8
- D. 4
- E. *7

67 У пацієнта 51-го року сильний головний біль, дзвін у вухах, нудота, АТ-180/110 мм рт.ст. Який синдром спостерігається у пацієнта?

- A. Хронічної недостатності кровообігу
- B. Гострої серцевої недостатності
- C. *Гіпертензивний
- D. Гострої судинної недостатності
- E. Гострої коронарної недостатності

68 До фельдшера ФАПу звернулась жінка, яка під час консервування облила ліву ногу окропом. Вкажіть площу опіку нижньої кінцівки за правилом "дев'ятки":

- A. 36%

- B.** 1%
- C.** 27%
- D.** *18%
- E.** 9%

69 Під час транспортування у роділлі 25-ти років у машині ШМД почалися інтенсивні потуги з інтервалом 1-2 хвилини, тривалістю 50 секунд. Починається прорізування голівки плоду. Промежина, висота якої 3 см, зблідла. Яким має бути наступний етап невідкладної допомоги?

- A.** Вакуум-екстракція плоду
- B.** Накладання акушерських щипців
- C.** *Епізіотомія
- D.** Вичікувальна тактика
- E.** Захист промежини

70 На ФАП доставлено хворого 45-ти років із скаргами: біль у епігастрії з подальшим переміщенням у праву здухвинну ділянку, нудота, одноразове блювання. Позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга, Воскресенського, Ровзінга, Сітковського. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Защемлена грижа
- B.** Гостра кишкова непрохідність
- C.** *Гострий апендицит
- D.** Гострий панкреатит
- E.** Гострий холецистит

71 Пацієнт 60-ти років з цирозом печінки висловлює скарги на слабкість, холодний піт, запаморочення, випорожнення чорного кольору. Вдома короткочасно знепритомнів. Об'єктивно: Рс- 102/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Кровотеча з пухлини легенів у фазі розпаду
- B.** Виразка дванадцятипалої кишки, що кровоточить

С. *Кровотеча з розширених вен стравоходу

Д. Пухлина товстої кишки

Е. Пухлина шлунку

72 У новонародженої дитини спостерігаються: ціаноз шкіри, слабкий крик, поверхнєве нерівномірне дихання, P_s - 56/хв, м'язовий тонус знижений, кінцівки зігнуті. При проведенні непрямого масажу серця подушечки двох великих пальців розташовані на груднині дитини. Вкажіть найчастіше ускладнення, яке може виникнути при покладанні рук фельдшера на мечоподібний відросток при здійсненні реанімаційних заходів:

А. *Ушкодження печінки

В. Перелом ребер

С. Гостра емфізема

Д. Відкритий пневмоторакс

Е. Гематома грудної клітки

73 Пацієнтка 30-ти років поскаржилась фельдшеру ФАПУ на відсутність місячних впродовж останніх 7 місяців. Вагітності немає. Який попередній діагноз?

А. Клімактеричний синдром

В. Гіперменструальний синдром

С. Післякастраційний синдром

Д. Гіпоменструальний синдром

Е. *Аменорея

74 До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 49-ти років, який скаржиться на підвищення температури тіла, біль у ділянці серця, задишку. Хворіє останні три дні. Захворювання пов'язує з перенесеною 2 тижні тому ангіною. Об'єктивно: шкірні покриви та видимі слизові чисті. Мигдалики збільшені, пухкі. Тони серця ритмічні. Систолічний шум на верхівці. Який попередній діагноз?

А. Перикардит

- В.** Хронічний тонзиліт, загострення
- С.** Ревмокардит
- Д.** *Гостра ревматична лихоманка
- Е.** Міокардит

75 До приймального відділення доставлено хворого з підозрою на перфорацію виразки шлунка. Який із методів діагностики може підтвердити діагноз?

- А.** Іригоскопія
- В.** УЗД черевної порожнини
- С.** Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка з контрастом
- Д.** *Оглядова рентгенографія у вертикальному положенні
- Е.** Реографія

76 Фельдшер проводить спостереження за розвитком здорової дитини та планує профілактичні щеплення. Для профілактики гемофільної інфекції слід застосувати вакцину:

- А.** БЦЖ
- В.** Імовакс Поліо
- С.** *Хіберікс
- Д.** Приорікс
- Е.** Інфанрікс

77 До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною 1 місяць. Мати скаржиться на зникнення грудного молока. Дитину необхідно перевести на штучне вигодовування. Маса тіла при народженні 2900 гр. Вкажіть добову кількість молока (за об'ємним методом):

- А.** 750 мл
- В.** *700 мл
- С.** 600 мл

D. 650 мл

E. 500 мл

78 До фельдшера ФАПУ звернулася жінка з хлопчиком 9-ти років, якого укусив бродячий собака. В нижній третині правого передпліччя кілька глибоких, неправильної форми ран, які помірно кровоточать, забруднені слиною тварини. Що з переліченого треба зробити в першу чергу?

A. Застосувати грілку

B. Накласти гемостатичну пов'язку

C. Виміряти артеріальний тиск

D. Ввести правцевий анатоксин

E. *Промити рану розчином мила

79 Робітник 39-ти років звернувся до фельдшера здоров'я з скаргами на пекучий біль шкіри правої ноги. Під час роботи в лабораторії випадково розлив на ногу сірчану кислоту. З чого треба розпочати надання першої допомоги?

A. Направлення до опікового центру

B. Промивання етиловим спиртом

C. *Промивання струменем холодної води

D. Накладання пов'язки з фурациліном

E. Виконання хімічної нейтралізації

80 Фельдшер ФАПУ транспортує влітку породіллю. Пологи відбулися дорогою, 40 хвилин тому. Дитина знаходиться на животі матері, вкрита пелюшкою, стан її задовільний. Дитина піднімає голову, відкриває широко рот, шукає груди матері. Яка подальша дія фельдшера буде доцільною?

A. Спостерігати за новонародженим

B. Виміряти температуру тіла новонародженого

C. Провести профілактику офтальмії

D. Здійснити клеймування пуповини

Е. *Здійснити перше раннє прикладання дитини до грудей матері

81 Пацієнтка 22-х років звернулася до фельдшера ФАПУ зі скаргами на загальну слабкість, дратівливість, серцебиття, підвищену збудливість, поганий сон. При огляді: витрішкуватість, тремтіння пальців рук, пальпується збільшена щитоподібна залоза, Рс- 120/хв, АТ- 160/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

- А.** Мікседема
- В.** Нецукровий діабет
- С.** Ендемічний зоб
- Д.** *Тиреотоксикоз
- Е.** Артеріальна гіпертензія

82 У хворої 50-ти років із раком шийки матки виникла профузна кровотеча. До хворої викликали фельдшера ФАПУ. Яку допомогу потрібно надати?

- А.** *Провести тугу тампонаду піхви
- В.** Ввести тампон із ефіром
- С.** Перетиснути черевну аорту
- Д.** Ввести но-шпу внутрішньом'язово
- Е.** Накласти шов на шийку матки

83 Яка патологія пологової діяльності розвинулась у роділлі 24-х років, якщо після 8 годин нормальної пологової діяльності перейми стали недостатньо сильними і тривалими, проміжок часу між ними збільшився?

- А.** Патологічний прелімінарний період
- В.** Дискоординована пологова діяльність
- С.** *Вторинна слабкість пологової діяльності
- Д.** Надмірно сильна пологова діяльність
- Е.** Первинна слабкість пологової діяльності

84 До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка зі скаргами на ниючий біль унизу живота, що періодично підсилюється, температуру – 37,6°C, загальну слабкість. Остання менструація без затримки і особливостей. В анамнезі кіста яєчника. Бімануально - матка звичайних розмірів, щільна, рухома, болюча. Біля неї визначається тугоеластичне утворення до 10 см, болюче, тугорухоме. Встановіть діагноз:

- A.** Порушена позаматкова вагітність
- B.** Гострий аднексит
- C.** *Перекрут ніжки кісти яєчника
- D.** Розрив капсули кісти яєчника
- E.** Апоплексія яєчника

85 Хворому призначено 32 ОД інсуліну. У фельдшера ФАПУ інсулінового шприца не було. Яку кількість інсуліну потрібно набрати у шприц об'ємом 2 мл?

- A.** 0,9 мл
- B.** 0,7 мл
- C.** 0,3 мл
- D.*** 0,8 мл
- E.** 0,5 мл

86 Фельдшер проводить бесіду зі школярами на тему: "Профілактика карієсу". Звертає увагу на те, що захворювання можна попередити, якщо дотримуватись заходів профілактики і пропонує обмежити вживання в їжу:

- A.** *Цукор, солодощі
- B.** Харчова сіль
- C.** Риба, м'ясо
- D.** Молоко, молочні продукти
- E.** Овочі, фрукти

87 У дитини при нападі бронхіальної астми поверхнєве дихання з різко

утрудненим видихом, наростає ціаноз, акроціаноз. Ефекту від використання сальбутамолу та еуфіліну немає. Що необхідно призначити?

- A. 5% р-н аскорбінової кислоти 0, 2 мл/кг
- B. 2% супрастин 1-2 мг/кг
- C. 1% димедрол 1 мг/кг
- D. 50% анальгін 0,1 мл/рік життя
- E. *3% преднізолон 2-3 мг/кг

88 До фельдшера ФАПУ звернулась мати з дитиною 3-х років. Зі слів матері, дитина приблизно 45 хвилин тому випадково з'їла 8 таблеток тазепама. Батьками ніякі медичні втручання не проводилися. Якими повинні бути дії фельдшера?

- A. Ввести в/в крапельно 0,9% розчин натрію хлориду
- B. Госпіталізувати у відділення інтенсивної терапії
- C. Спостерігати за дитиною
- D. Поставити очисну клізму
- E. *Промити шлунок до чистих промивних вод

89 При проведенні патронажу новонародженої дитини фельдшер ФАПУ помітив на шкірі кінцівок і тулуба лущення та гіперемію. Порекомендуйте лікарську рослину для проведення гігієнічної ванни:

- A. Звіробій
- B. Подорожник
- C. Липа
- D. Мати-й-мачуха
- E. *Черета

90 Фельдшер швидкої медичної допомоги за призначенням лікаря ввів пацієнту в/в струменево 25% розчин магнію сульфату. Під час венепункції була здійснена наскрізна перфорація вени. Вкажіть можливе ускладнення:

- A. Некроз

- В.** Інфільтрат
- С.** *Гематома
- Д.** Тромбофлебіт
- Е.** Повітряна емболія

91 Хворий 41-го року зловживає алкоголем близько 7-ми років, останні роки похмеляється. На третій день після відміни алкоголю відчув страх, тривогу, занепокоєння, почав бачити мух та павуків, які повзали по ньому, далі помітив, що у кімнаті з'явилися кури, пацюки, маленькі чоловічки. Бігав, кричав, ховався. Орієнтація в собі збережена, в часі та просторі не орієнтований. Який стан розвинувся у хворого?

- А.** Старечий параноїд
- В.** Маніакально-депресивний психоз
- С.** *Алкогольний делірій
- Д.** Епілептичний психоз
- Е.** Шизофренія

92 Вагітна 26-ти років з терміном вагітності 34 тижні звернулася до фельдшера швидкої допомоги зі скаргами на біль у епігастральній ділянці, блювання, миготіння "мушок" перед очима, посмикування м'язів обличчя. Об'єктивно: АТ- 180/120 мм рт.ст. на обох руках, генералізовані набряки. Вкажіть, які анестезіологічні та реанімаційні заходи необхідно провести жінці в першу чергу:

- А.** *Призначити засоби, які попереджують судоми
- В.** Провести корекцію водно-електролітних порушень
- С.** Забезпечити ефективну вентиляцію легень (ШВЛ)
- Д.** Призначити гіпотензивні засоби
- Е.** Призначити дезагреганти

93 Яке із захворювань прямої кишки відноситься до передракових станів і підлягає обов'язковому диспансерному спостереженню та лікуванню?

- А.** Геморой

- В.** Стриктурни анального отвору
- С.** Нориця
- Д.** Тріщини прямої кишки
- Е.** *Поліп прямої кишки

94 Під час активного патронажу мати дівчинки 12-ти місяців звернулась із запитанням до фельдшеру ФАПУ: "Скільки зубів повинно бути у моєї дитини?"

- А.** 13
- В.** 6
- С.** 12
- Д.** 4
- Е.** *8

95 Хворий 47-ми років доставлений ШМД з діагнозом "гострий інфаркт міокарда", став відмічати різке погіршення самопочуття: посилився біль за грудниною, з'явилася задишка, запаморочення. Об'єктивно: Рs- 120/хв., тони серця глухі, рясне потовиділення. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- А.** Серцева астма
- В.** *Кардіогенний шок
- С.** Гостра судинна недостатність
- Д.** Стенокардія
- Е.** набряк легень

96 Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Рs- 92/хв. Живіт напружений, болісний більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Перекрут ніжки кісти яєчника
- В.** Фіброміома

- C. Гострий апендицит
- D. Позаматкова вагітність
- E. *Апоплексія яєчника

97 До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 65-ти років зі скаргами на нападоподібний надсадний кашель з виділенням незначної кількості кров'янистого харкотиння, ниючі болі в правій половині грудної клітки, загальну слабкість, задишку, схуднення. Скарги з'явилися кілька місяців тому. Який попередній діагноз?

- A. *Рак легень
- B. Пневмонія
- C. Хронічний бронхіт
- D. Бронхіальна астма
- E. Міозит

98 Фельдшера ШМД викликали до дитини 4-х місяців. Дитина втратила за добу 800 гр. маси тіла внаслідок блювання та проносу. Рефлекси слабкі, тургор тканин знижений, шкіра суха, сірувато-ціанотична, риси обличчя загострені, стан важкий. Який стан у дитини?

- A. Гіпервітаміноз D
- B. Рахіт
- C. *Кишковий токсикоз з ексикозом
- D. Гіпотрофія
- E. Паратрофія

99 Фельдшер проводить серцево-легеневу реанімацію потерпілому, у якого констатовано клінічну смерть. Що з нижчеперерахованого вказує на ефективність закритого масажу серця?

- A. Розширені зіниці
- B. Відсутність свідомості
- C. Пасивні рухи грудної клітки

D. *Пульсація на сонній артерії

E. Зниження температури тіла

100 Потерпілий упав з мотоцикла і вдарився лівим плечем о бордюр. Об'єктивно: плечовий суглоб деформований, кінцівка знаходиться у вимушеному положенні, приведена до тулуба, активні рухи в плечовому суглобі відсутні. На яке ушкодження вказують ці симптоми?

A. Розтягнення зв'язок суглоба

B. Перелом плеча

C. Розрив м'язів

D. Забій м'яких тканин

E. *Вивих плеча

101 У пацієнта, який впродовж години знаходився на вулиці при температурі -29°C , скарги на оніміння щік, носа та вушних раковин. Шкіра бліда, холодна на дотик. Больова і тактильна чутливість знижені. Яка першочергові заходи при наданні допомоги?

A. Накласти на уражені ділянки пов'язки з маззю Вишневського

B. Опромінити ніс, щоки та вушні раковини променями УВЧ

C. Викликати швидку допомогу та дати гарячий чай

D. *Розтерти рукою до почервоніння шкіри

E. Протерти спиртом та накласти термоізоляційну пов'язку

102 Фельдшер ФАПУ стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином пероксиду водню. Чим потрібно тричі промити вироби після стерилізації?

A. 0,5% розчин нашатирного спирту

B. *Стерильний ізотонічний розчин

C. Розчин фурациліну 1:5000

D. Дистильована вода

E. 2% розчин натрію гідрокарбонату

103 Фельдшер прийшов на патронаж до дитини віком 3 місяці. Дитина народилася з масою 3300 г, довжиною 53 см. При визначенні маси тіла отриманий результат 4500 г. Який дефіцит маси тіла?

- A. 900 г
- B. 800 г
- C. 700 г
- D. *1000 г
- E. 600 г

104 На прийомі у фельдшера ФАПУ дитина 3-х місяців. Вигодовується грудним молоком, скарг немає. Дефіцит маси тіла 17%, підшкірно-жирова клітковина збережена на обличчі і кінцівках. Товщина підшкірно-жирового шару на животі 1 см, тургор тканин і еластичність знижені. Це свідчить про наявність у дитини:

- A. Гіпостатури
- B. Паратрофії
- C. Гіпотрофії III ст
- D. Гіпотрофії I ст
- E. *Гіпотрофії II ст

105 Фельдшер ШМД приїхав на виклик до пацієнта 67-ми років. Об'єктивно: у пацієнта відсутні рефлекси на зовнішні подразники, спостерігаються розлади функцій органів дихання та серцево-судинної системи. Назвіть стан пацієнта:

- A. Сопорозний
- B. *Коматозний
- C. Колаптоїдний
- D. Шоковий
- E. Ступорозний

106 До фельдшера ФАПу звернувся хворий, якому багаторазово вводили внутрішньовенно ліки. Скаржиться на біль, гіперемію, наявність ущільнення по ходу вени. Яке виникло ускладнення?

- A. Некроз
- B. *Флебіт
- C. Сепсис
- D. Інфільтрат
- E. Гематома

107 У разі судом на фоні спазмофілії треба вводити:

- A. Внутрішньом'язово 0,5% р-н седуксену
- B. Внутрішньом'язово 25% р-н магнію сульфату
- C. Внутрішньом'язово 1% р-н лазиксу
- D. *Внутрішньовенно 10% р-н кальцію глюконату 0,2 мл/кг
- E. Внутрішньом'язово фенобарбітал 10 мг/кг

108 Дитина 4-х років хворіє другий день. Хвороба розпочалась гостро з підвищення температури тіла до 38°C. Скаржиться на біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Об'єктивно: гіпертрофія мигдаликів, гній у лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібно крапкова яскраво червона висипка, яка згущується в природних складках. Носо-губний трикутник блідий. Яке захворювання має місце у дитини?

- A. Менінгококова інфекція
- B. Вітряна віспа
- C. *Скарлатина
- D. Краснуха
- E. Кіп

109 У дитини 12-ти років важкий загальний стан. Спостерігається інспіраторна задишка, кашель поступово втрачає гучність до повної афонії голосу. Наявні симптоми характерні для такого захворювання:

- A. набряк Квінке
- B. Обструктивний бронхіт
- C. Вогнищева пневмонія
- D. *Дифтерія гортані
- E. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

110 До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка 42-х років із скаргами на сухість шкіри, ламкість і викришування нігтів, випадіння волосся, спотворення смаку (вживає крейду). Для якого синдрому характерні такі ознаки?

- A. Гемолітичний
- B. Геморагічний
- C. *Сидеропенічний
- D. Анемічний
- E. Пухлинної інтоксикації

111 Фельдшер ФАПУ оглядає дитину віком 6 днів. На шкірі сідниць, стегон, природних складок і голови відмічаються дрібні, поверхневі пухирці розміром 1-2 мм в діаметрі, наповнені прозорим вмістом. Чим необхідно обробляти елементи висипки?

- A. Дитячий крем
- B. 3% розчин перекису водню
- C. Елементи висипки не обробляють
- D. Переварена вода
- E. *1-2% спиртовий розчин діамантового зеленого

112 До ФАПУ звернулася жінка 32-х років зі скаргами на тривалі і рясні менструації впродовж півроку, тягнучий біль внизу живота, слабкість. При гінекологічному обстеженні тіло матки збільшене до 11-12 тижнів вагітності, щільне, рухоме, безболісне. У крові: Нв- 90 г/л. Яку патологію можна запідозрити?

- A. Кістома яєчника
- B. *Міома матки
- C. Вагітність
- D. Дисфункціональна маткова кровотеча
- E. Рак тіла матки

113 Фельдшер здоров'я повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- A. Імпульсний
- B. *Постійний
- C. Високочастотний
- D. Модульований
- E. Змінний

114 Пацієнт 40-ка років скаржиться на відчуття стиснення і болі за грудниною. При кашлі - пінисті виділення яскраво-червоного кольору. Із анамнезу відомо, що хворіє на туберкульоз легень впродовж 10-ти років. Який препарат слід застосувати першочергово?

- A. 5% розчин аскорбінової кислоти
- B. *12,5% розчин етамзілату, 2 мл в/в
- C. 10% розчин кальцію хлориду
- D. 1% розчин вікасолу, 1,0 мл в/м
- E. Преднізолон

115 Вранці при огляді дітей в дитячому садку у 5-річної дівчинки виявили папульозно-везикулярний висип на волосяній частині голови. Про яке захворювання слід думати?

- A. Скарлатина
- B. Краснуха

С. Менінгококова інфекція

Д. *Вітряна віспа

Е. Кір

116 До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 29-ти років, який у зв'язку із загостренням хронічного тонзиліту приймав антибіотики. Раптово підвищилась температура тіла, з'явився біль у суглобах, животі, на шкірі з'явилась геморагічна висипка з характерним симетричним розташуванням елементів, особливо на нижніх кінцівках. Відзначає червоний колір сечі. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Амлілоїдоз нирок

В. Гострий цистит

С. Гострий гломерулонефрит

Д. Гострий пієлонефрит

Е. *Геморагічний васкуліт

117 На ФАП до фельдшера звернулася дівчина 17-ти років зі скаргами на неможливість статевого життя, відсутність менструації. При обстеженні виявлено, що зовнішні статеві органи розвинуті правильно, пальцем вдається проникнути на 1 см за задню спайку, піхва відсутня. Під час ректального обстеження матка не пальпується, визначається невеликий тяж. Для якої патології характерні такі дані?

А. Атрезія дівочої пліви

В. *Аплазія піхви та матки

С. Атрезія піхви

Д. Аплазія піхви

Е. Гіпоплазія піхви та матки

118 До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 45-ти років, який два тижні тому отримав колоту рану правої кисті. Пацієнт скаржиться на слабкість, утруднення ковтання, судомні жувальних м'язів, пітливість. При об'єктивному обстеженні фельдшер помітив сіпання м'язів під час доторкання пінцетом до

рани, підвищений тонус м'язів кінцівки, підсилення сухожильних рефлексів. Фельдшер запідозрить таке захворювання:

- А. *Правець
- В. Сибірка
- С. Гнильна інфекція
- Д. Газова інфекція
- Е. Дифтерія рани

119 Проводять обстеження потерпілого, який був збитий вантажівкою. Він знаходиться без свідомості, з носа та вух витікає ліквор і кров. Про що свідчать вище перераховані симптоми?

- А. Перелом щелеп
- В. Перелом склепіння черепа
- С. *Перелом основи черепа
- Д. Носова кровотеча
- Е. Перелом носа

120 Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, мокнуття, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально - гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання запідозрив фельдшер?

- А. Токсикодермія
- В. Атопічний дерматит
- С. Нейродерміт
- Д. *Екзема
- Е. Кропив'янка

121 Мати привела на ФАП хлопчика 3-х років, у якого спостерігаються смердючі виділення з правої половини носа та утруднення дихання через

праву половину носа, що виникли 2 дні тому на фоні повного здоров'я. Який попередній діагноз?

- A. Гострий правобічний фронтит
- B. Гострий риніт
- C. *Стороннє тіло правої половини носа
- D. Озена
- E. Гострий правобічний гайморит

122 У дитини 2-х місяців у пахвинній ділянці спостерігається гіперемована мокнуча поверхня шкіри внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити?

- A. *Попрілості III ступеня
- B. Везикулопустульоз
- C. Пухирчатка новонародженого
- D. Пітниця
- E. Попрілості I ступеня

123 Хворий після падіння з дерева відчув сильний біль у правій поперековій ділянці, який іррадіює в статеві органи. При обстеженні виявлено порушення м'язів правої поперекової ділянки, позитивний симптом Пастернацького. Гематурія. Які дії медпрацівника?

- A. Вести спостереження за станом хворого
- B. Покласти грілку на поперекову ділянку
- C. Заспокоїти хворого
- D. *Терміново госпіталізувати до урологічного відділення
- E. Ввести баралгін

124 Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом стали болючі перейми. Контракційне кільце на рівні пупка, косо розташоване. Нижній сегмент матки болючий під час пальпації. Положення плоду поздовжнє, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плоду приглушене

16/хв. Яке ускладнення виникло у пологах?

- А. *Загроза розриву матки
- В. Повний розрив матки
- С. Розрив промежини
- Д. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- Е. Центральне передлежання плаценти

125 Дівчину 17-ти років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці ока. Їм передують зорові порушення, випадіння поля зору. Інколи, під час нападу, буває блювання. Напад триває декілька годин. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- А. Вегето-судинна дистонія
- В. Гіпертонічний криз
- С. *Мігрень
- Д. Транзиторний ішемічний напад
- Е. Субарахноїдальна гематома

126 Жителька села звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на спрагу, свербіж шкіри та сухість, схильність до фурункульозу. До якого найбільш інформативного дослідження крові необхідно підготувати хвору?

- А. Біохімічний аналіз
- В. На вміст сечовини
- С. Печінкові проби
- Д. *На вміст глюкози
- Е. Загальний аналіз

127 У пацієнта 43-х років після введення внутрішньом'язово біциліну виникли сильний головний біль, шум у вухах, біль за грудниною, відчуття жару, пітливість. Об'єктивно: стан хворого важкий, Рс- 115/хв., ниткоподібний, АТ- 70/30 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно ввести в першу чергу?

- A. *Адреналін
- B. Допамін
- C. Мезатон
- D. Атропін
- E. Строфантин

128 Хвора 34-х років скаржиться на слабкість, швидку втомлюваність, шум у вухах, задишку, бажання їсти крейду. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, тони серця ритмічні, систолічний шум на верхівці, АТ- 120/70 мм рт.ст. Рс- 84/хв. У крові: знижені гемоглобін, кольоровий показник. Який препарат треба призначити хворій?

- A. Вітамін А
- B. *Фенюльс
- C. Вітамін Е
- D. Вітамін В₁₂
- E. Вітамін С

129 Чоловік 28-ми років звернувся до фельдшера здоров'я із скаргами на підвищення температури тіла, спонтанний біль у ділянці кінчика носа, набряклість навколишніх тканин. При огляді виявлено конусоподібне випинання при вході у ніс, шкіра носа гіперемована, напружена і дуже чутлива. Хворий працює у лабораторії з агресивними хімічними агентами. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

- A. -
- B. Опік носа
- C. *Фурункул носа
- D. Відмороження носа
- E. Бешиха носа

130 Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта, який скаржиться на біль у грудях, задишку. Під час обстеження з'ясувалось, що він багато років страждає на варикозне розширення вен, двічі був тромбофлебіт. Стан

погіршився раптово після фізичного навантаження. Під час спілкування чоловік знепритомнів, не дихає, пульс на сонній артерії не визначається. Фельдшер констатував клінічну смерть. Що стало причиною смерті?

- A. Травма грудної клітки
- B. Спонтанний пневмоторакс
- C. Фібриляція шлуночків
- D. *Тромбоемболія легеневої артерії
- E. Інфаркт міокарда

131 До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 38-ми років зі скаргами на біль у поперековій ділянці, часте, болісне сечовипускання, сеча каламутна, температура тіла 37,6°C. Вважає себе хворим 2 роки. Об'єктивно: шкіра бліда, невеликі набряки під очима, симптом Пастернацького позитивний. Який попередній діагноз?

- A. Хронічний гломерулонефрит
- B. Гострий гломерулонефрит
- C. *Хронічний пієлонефрит
- D. Гострий пієлонефрит
- E. Нирковокам'яна хвороба

132 На ФАП звернулася вагітна в терміні 16 тижнів зі скаргами на ниючий біль внизу живота та поперековій ділянці. Загальний стан не порушений. АТ-120/80 мм рт.ст. на обох руках. Рс- 82/хв., ритмічний. Об'єктивно: тіло матки в підвищеному тонусі, чутливе під час пальпації. Який попередній діагноз?

- A. *Загроза викидня
- B. Викидень, що розпочався
- C. Загроза передчасних пологів
- D. Загроза розриву матки
- E. Викидень у розпалі

133 В приймальне відділення доставлено хворого 20-ти років без свідомості.

В його кишені знайдена картка хворого на цукровий діабет. Шкіра бліда, тургор знижений. Дихання шумне, глибоке, із рота запах ацетону. ЧСС- 105/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно приготувати в першу чергу для надання невідкладної допомоги?

- А. 5% розчин глюкози
- В. Реополіглюкін
- С. 0,1% розчин адреналіну
- Д. *Інсулін
- Е. 0,9% розчин натрію хлориду

134 Фельдшер ШМД прибув на виклик. Пацієнтка висуває скарги на біль у правому підребер'ї, багаторазове блювання без полегшення, підвищення температури до 39°C. Об'єктивно: живіт болісний у правому підребер'ї, де визначається локальне напруження м'язів, пальпується овальне щільне утворення 6x4 см. Це клінічні ознаки такого захворювання:

- А. *Гострий холецистит
- В. Хвороба Крона
- С. Гострий апендицит
- Д. Неспецифічний виразковий коліт
- Е. Гострий панкреатит

135 До фельдшера ФАПу звернувся постраждалий на 4-ту добу після вогнепального кульового поранення м'яких тканин стегна. Стан постраждалого раптово став погіршуватись. Скарги на розпираючий біль у рані в середній третині стегна. Біль посилюється за останні 12 годин. набряк шкіри і підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла 38,2°C, Рс- 102/хв. Краї рани зяють, тьмяні, м'язи вибухають у рані, при захваті пінцетом тканини розпадаються. Який вид інфекції розвинувся в рані?

- А. Аеробна грамнегативна інфекція
- В. Аеробна грампозитивна інфекція
- С. Дифтерія рани
- Д. Гнильна інфекція

Е. *Анаеробна інфекція

136 До фельдшера здоровпункту підприємства звернулась жінка 45-ти років зі скаргами на кашель із виділенням невеликої кількості слизисто-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 37,8°C, загальну слабкість. Хворіє впродовж 4-х діб. Захворювання пов'язує з переохолодженням. Перкуторно - ясний легенеий звук; аускультативно - вологі хрипи у нижніх відділах лівої легені. Рентгенологічно - ділянки затемнення легеневої тканини діаметром 1-2 см у нижній частці лівої легені. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Гострий бронхіт
- В.** *Гостра позашпитальна пневмонія
- С.** Хронічний бронхіт
- Д.** Бронхоектатична хвороба
- Е.** Гостра шпитальна пневмонія

137 У флаконі 1,0 г цефтриаксону, його розвели 5 мл. ізотонічного розчину. Скільки потрібно набрати в шприц розчину, якщо дитині призначено 300 мг препарату?

- А.** *1,5 мл
- В.** 5 мл
- С.** 4 мл
- Д.** 2 мл
- Е.** 3 мл

138 Фельдшер швидкої допомоги під час підшкірної ін'єкції олійного розчину камфори виявив, що у пацієнта виник раптовий біль, ціаноз верхньої половини грудної клітки і обличчя. Назвіть ускладнення ін'єкції:

- А.** Повітряна емболія
- В.** Алергійна реакція
- С.** Колапс
- Д.** Запаморочення

Е. *Жирова емболія

139 При обстеженні пацієнтки 23-х років за допомогою піхвових дзеркал виявили, що слизова піхви вкрита серозними нашаруваннями, кровить від дотику. Який попередній діагноз?

- А.** Гострий вульвіт
- В.** Гострий цервіцит
- С.** Гострий метрит
- Д.** *Гострий кольпіт
- Е.** Рак піхви

140 У пацієнта 18-ти років II стадія гарячки. Він збуджений, на щоках рум'янець, марить, температура тіла 40°C, губи вкриті кірочками. Про що в першу чергу потрібно подбати при догляді за хворим?

- А.** Провітрити палату
- В.** *Створити індивідуальний пост
- С.** Подати міхур з льодом
- Д.** Подати грілку
- Е.** Надати горизонтального положення хворому

141 Фельдшер ШМД оглядає потерпілого з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею. При наданні першої допомоги провів тимчасову зупинку кровотечі за допомогою джгута, ввів потерпілому знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?

- А.** Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- В.** Надання хворому зручного положення
- С.** Імобілізація пошкодженої кінцівки
- Д.** Холод на місце травми
- Е.** *Накладання захисної асептичної пов'язки

142 До фельдшера здоровпункту звернулася жінка зі скаргами на різкий біль внизу живота зліва, затримку менструації, запаморочення, нудоту, блювання. При огляді: шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст. Пульс частий, слабого наповнення. Яку невідкладну допомогу повинен надати фельдшер?

- A. Направити в жіночу консультацію
- B. Промити шлунок
- C. Ввести знеболюючі препарати
- D. *Покласти холод та госпіталізувати
- E. Направити на УЗД

143 До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 75-ти років. Його турбують різкий біль у лівому надпліччі, набряк та деформація в ділянці ключиці. Якою пов'язкою необхідно виконати іммобілізацію при даній травмі?

- A. Хрестоподібна
- B. Колосовидна
- C. Черепашача
- D. Спіральна
- E. *Дезо

144 Фельдшер ФАПу обстежує хворого 55-ти років, який скаржиться на погіршення зору, слабкість у ногах і руках, пекучій біль в них, який зменшується при ходінні босоніж. 20 років хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: гіпостезія в руках і ногах, за типом "рукавичок" та "шкарпеток". Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Мієліт
- B. *Діабетична полінейропатія
- C. Попереково-крижовий радикуліт
- D. Облітеруючий ендартеріїт
- E. Поліомієліт

145 В школі фельдшером ФАПу діагностовано скарлатину. Дитина

госпіталізована. Накладений карантин. Контактні діти обстежені, на них заведені листи спостереження. Скільки днів триватиме спостереження?

- A. 14
- B. 21
- C. 3
- D. *7
- E. 10

146 До фельдшера ФАПу звернулася мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання у дитини "фонтаном" без домішки жовчі, погану прибавку маси тіла. Блювання з'явилося з 10-го дня після народження, має кислий характер, за об'ємом більше, ніж висмоктує молока дитина. При огляді живота з'являється симптом "піскового годинника". Яке захворювання у дитини?

- A. *Пілоростеноз
- B. Виразкова хвороба
- C. Гострий гастрит
- D. Диспепсія
- E. Пілороспазм

147 До фельдшера ФАПу звернулася жінка, мати двох дітей, яка скаржиться на наявність вузлів м'яко-еластичної консистенції по зовнішній поверхні лівого стегна з переходом на гомілку і появи набряку на лівій стопі до кінця робочого дня. Після нічного відпочинку набряк проходить. Початок хвороби пов'язує з вагітністю і пологами. Користується еластичними панчохами. Сформулюйте попередній діагноз:

- A. Слоновість лівої нижньої кінцівки
- B. Гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої гомілки
- C. *Варикозне розширення підшкірних вен лівої гомілки
- D. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен лівої гомілки
- E. Облітеруючий ендартеріт лівої нижньої кінцівки

148 Каретою швидкої допомоги доставлена у пологовий будинок роділля 40 тижнів. Пологової діяльності немає. Дві години тому почалася значна кровотеча, яка продовжується дотепер. Дослідження піхви: шийка згладжена, відкриття на 1 см; внутрішній зів повністю закритий губчастою тканиною, значна кровотеча. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гіпотонічна кровотеча
- B. Шийкова вагітність
- C. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- D. Бічне передлежання плаценти
- E. *Центральне передлежання плаценти

149 Пацієнт 48-ми років звернувся зі скаргами на стискаючий біль у ділянці серця, що виникає на тлі фізичного навантаження, оніміння 4-5 пальців лівої руки. На ЕКГ: зміщення сегменту ST нижче ізолінії, негативний зубець T. Після больового нападу змін на ЕКГ немає. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гостра судинна недостатність
- B. Гостра серцева недостатність
- C. Інфаркт міокарда
- D. *Стенокардія
- E. Стенокардія напруги

150 Пацієнт 53-х років з хронічною недостатністю кровообігу лікується серцевими глікозидами. Викликав ШМД з приводу втрати апетиту, нудоти, блювання, перебоїв у роботі серця. Передозування якого препарату, в першу чергу, викликало погіршення самопочуття пацієнта?

- A. Рибоксин
- B. Гіпотіазид
- C. Нітросорбід
- D. Аспаркам
- E. *Дигітоксин

Файл: Буклет 2013 Лікув.справа.doc
Каталог: C:\WINDOWS\system32
Шаблон: C:\Documents and Settings\User\Application
Data\Microsoft\Шаблоны\Normal.dotm
Заголовок:
Содержание:
Автор: Admin
Ключевые слова:
Заметки:
Дата создания: 02.04.2014 10:42:00
Число сохранений: 2
Дата сохранения: 02.04.2014 10:42:00
Сохранил: Admin
Полное время правки: 0 мин.
Дата печати: 14.04.2014 11:26:00
При последней печати
страниц: 49
слов: 8 627 (прибл.)
знаков: 49 180 (прибл.)