

Крок M Сестринська справа ***Медсестринство в акушерстві***

1

При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над входом в малий таз визначається округла, помірної щільноті балотуюча частина плода. Спинка плода зліва. Якому визначеню за акушерською термінологією відповідають отримані дані акушерського дослідження?

- A** *I позиція, головне передлежання
- B** II позиція, головне передлежання
- C** I позиція, сідничне передлежання
- D** II позиція, сідничне передлежання
- E** Поперечне положення

2

Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяполового періоду?

- A** *2 години
- B** 3 години
- C** 6 годин
- D** 24 години
- E** 48 годин

3

Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився I період пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

- A** *Повне відкриття шийки матки
- B** Народження посліду
- C** Відкриття шийки матки на 3 см
- D** Постійний ниючий біль
- E** Народження плода

4

Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна зробити патронаж?

- A** *Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку
- B** Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку
- C** Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку
- D** Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку
- E** Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку

5

Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона повинна застосувати?

- A** *Прийоми Леопольда-Левицького
- B** Призначення сечі на наявність ХГ
- C** Вимірювання обводу живота
- D** Бімануальне обстеження
- E** Огляд шийки матки у дзеркалах

6

Вагітна М., 31 року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що дорівнює 90 см і ВСДМ- 30 см. Яка передбачувана маса плода?

- A** *2700 г
- B** 3100 г
- C** 3000 г
- D** 2900 г

E 2500 г

7

Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальнюю пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?

A *Альфельда

B Кюстнера-Чукалова

C Шредера

D Довженка

E Клейна

8

Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ж/к зі скаргами на швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть допустиму прибавку ваги за тиждень.

A *350 грамів

B 250 грамів

C 450 грамів

D 550 грамів

E 650 грамів

9

У післяпологовому відділенні медична сестра здійснює I етап сестринського процесу. Що із нижче переліченого належить до суб'єктивного обстеження пацієнтки:

A *Бесіда з породіллею

B Вимірювання температури

C Визначення частоти пульсу

D Оцінка характеру лохій

E Визначення рівня гемоглобіну в крові

10

Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні завнішніх розмірів тазу отримали дані: 26-28-31-20. Який таз у жінки?

A *Нормальний

B Чоловічий

C Плоскорахітичний

D Простий плоский

E Загальнорівномірнозвужений

11

Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка плода розташована праворуч. Вкажіть позицію плоду?

A *Друга

B Перша

C П'ята

D Четверта

E Третя

12

У вагітної до початку пологової діяльності відійшли навколоплодні води. Про яке відходження вод їде мова?

A *Передчасне

B Раннє

C Своєчасне

D Запізніле

E -

13

Вагітна в терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4-6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі.
Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки?

A *Блювання вагітної

B Відраза до продуктів харчування

C Порушення засвоєння їжі

D Порушення режиму сна

E Отруєння

14

Пацієнта 20 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена вагітність 7-8 тижнів.
Назвати документ, який оформляється при взятті на облік по вагітності?

A *Індивідуальна карта вагітної і породіллі

B Обмінна карта

C Амбулаторна карта

D Історія пологів

E Контрольна карта диспансерного спостереження

15

На 3-й день после родов у родильницы поднялась температура – 38°C, боль в молочной железе. Медсестра осмотрела родильницу: в левой молочной железе пальпируется уплотнение 7x6, болезненное, над ним гиперемия, отек. Каковы действия медсестры по реализации плана медсестринского вмешательства?

A *Пузырь со льдом на область молочной железы, вызвать врача

B Ввести анальгетики

C Грелка на область молочной железы

D Ввести жаропонижающие средства

E Компресс на молочную железу

16

Роженица Н., в III периоде родов, признаки Альфельда, Шредера положительные. Что должна сделать медсестра для реализации плана медсестринских вмешательств?

A *Предложить роженице потужиться

B Потянуть за пуповину

C Провести наружный массаж матки

D Измерить АД

E Применить метод Абуладзе

17

У беременной 27 лет, при тазометрии выявилось, что размеры таза составили 26-29-31-20. Индекс Соловьева - 14,5 см. Определите истинную конъюгату.

A *11 см

B 12 см

C 9 см

D 10 см

E 13 см

18

У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 38-39 тижнів з кровотечею зі статевих органів. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко повністю закрите

губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?

- A *Центральне передлежання плаценти
- B Бокове передлежання плаценти
- C Крайове передлежання плаценти
- D Низьке прикріплення плаценти
- E Шийна вагітність

19

Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржиться на підвищення температури до 39°C, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих органів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

- A *Післяпологовий ендометрит
- B Лохіометра
- C Аднексит
- D Перитоніт
- E Післяпологова виразка

20

Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

- A *Нормальний таз
- B Простий плоский таз
- C Плоскорахітичний таз
- D Загальнозвужений таз
- E Поперечнозвужений таз

21

До полового будинку госпіталізовано жінку в строку вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ- 40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка 136 за 1 хв., та праворуч вище пупка 140 за 1 хв. Про що йде мова?

- A *Багатоплідна вагітність
- B Гідроцефалія плода
- C Гіантський плід
- D Розгинальне передлежання
- E Тазове передлежання

22

У пологовий будинок поступила роділля. Пологи II, термінові. Розміри тазу 23-26-28-17 см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті, болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло у роділлі?

- A *Загроза розриву матки
- B Розрив матки, що розпочався
- C Розрив матки, що відбувається
- D Тетанус матки
- E Звуження тазу III ступеню

23

У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

- A *Раннє
- B Вчасне
- C Передчасне
- D Запізніле
- E Високий надрив плодового міхура

24

Роділля К., 26 р. Пологи II. III період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість послідового періоду?

- A** *30 хвилин
- B** 15 хвилин
- C** 60 хвилин
- D** 45 хвилин
- E** 40 хвилин

25

Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для загальнорівномірнозвуженого тазу?

- A** *Всі розміри зменшені на однакову величину
- B** Вкорочені прямі розміри тазу
- C** Вкорочені поперечні розміри тазу
- D** Вкорочені усі косі розміри тазу
- E** Зменшення прямого розміру входу в малий таз

26

Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, "балотуюча", крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плоду.

- A** *Повздовжне положення, перша позиція, головне передлежання
- B** Повздовжне положення, друга позиція, головне передлежання
- C** Повздовжне положення, перша позиція, тазове передлежання
- D** Поперечне положення, друга позиція
- E** Повздовжне положення, друга позиція, тазове передлежання

27

Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені наступні розміри: 24-26-28-18см. Назвіть форму тазу вагітної.

- A** *Загальнорівномірнозвужений таз
- B** Поперечнозвужений таз
- C** Косозміщений таз
- D** Плоский таз
- E** Звужений таз

28

У породіллі в післяпологовому періоді медична сестра виявила кровотечу зі статевих шляхів. Крововтрата під час пологів склала 450мл. Розривів м'яких тканин родового каналу немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров, що витікає з матки, утворює згортки. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?

- A** *Гіпотонічна маткова кровотеча
- B** ДВЗ-синдром
- C** Атонічна кровотеча
- D** Розрив матки
- E** Емболія навколоплідними водами

29

Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу - перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

- A** *24 тижні
- B** 20 тижнів
- C** 16 тижнів
- D** 28 тижнів

E 32 тижні

30

Роділля М., 26 років, I період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і артеріального тиску у роділлі?

- A *Кожні 2 години
- B Кожні 4 години
- C Кожні 6 години
- D Кожну годину
- E Кожні 30 хвилин

31

У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви оберете:

- A *Щотижневе зважування вагітної
- B Підрахунок частоти дихання
- C Підрахунок частоти серцевих скорочень
- D Вимірювання температури тіла
- E Визначення внутрішньоутробної маси плода

32

На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:

- A *Наявність кров'янистих виділень із піхви
- B Показники температури тіла
- C Показники артеріального тиску
- D Частоту серцевих скорочень
- E Наявність апетиту

33

Породіллі проведений курс лікування з приводу післяполового маститу. При оцінці результатів медсестринських втручань Ви в першу чергу звернули увагу на:

- A *Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз
- B Нормалізацію лактації
- C Нормалізацію сну
- D Покращення апетиту
- E Покращення самопочуття

34

При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слаболужна. Це характерно для:

- A *III ступеню чистоти піхвового вмісту
- B I ступеню чистоти піхвового вмісту
- C II ступеню чистоти піхвового вмісту
- D IV ступеню чистоти піхвового вмісту
- E V ступеню чистоти піхвового вмісту

35

При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає:

- A *24 тижням вагітності
- B 36 тижням вагітності
- C 28 тижням вагітності
- D 32 тижням вагітності

E 40 тижням вагітності

36

Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.

- A *Нижче пупка ліворуч
- B Вище пупка праворуч
- C Нижче пупка праворуч
- D Вище пупка ліворуч
- E На рівні пупка

37

У пацієнтки 28 років під час профілактичного огляду було виявлено гіперемію в ділянці зовнішнього вічка шийки матки. Подальша тактика медичної сестри:

- A *Направити до лікаря гінеколога
- B Призначити спринцовування
- C Призначити піхвові ванночки
- D Призначити заспокійливі
- E Зробити посів піхвових видіlenь

38

Роділля поступає в пологовий будинок. Для визначення очікуваної маси плода медсестра вимірює обвід живота. На якому рівні слід розмістити сантиметрову стрічку?

- A *На рівні пупка
- B Посередині між пупком і мечоподібним відростком
- C На три поперечні пальці нижче пупка
- D На два поперечні пальці вище пупка
- E На рівні висоти стояння дна матки

39

Роділля ,34 років, доставлена машиною швидкої допомоги в пологовий будинок. Пологи в строк. За яким показником медична сестра оцінить початок половогої діяльності?

- A *За частотою та тривалістю перейм
- B За станом роділлі
- C За станом плода
- D За часом вилиття навколоплодових вод
- E За станом плодового міхура

40

Другий період пологів. Голівка плода прорізується. Яке залежне сестринське втручання потрібно виконати з метою профілактики кровотечі в III періоді пологів?

- A *Ввести метилергометрин
- B Ввести вікасол
- C Ввести дицилон
- D Ввести маммофізин
- E Ввести анальгін

41

У породіллі на третю добу післяполового періоду з'явилися скарги на болі в молочних залозах. Молочні залози значно та рівномірно збільшені, нагрубші, болючі при пальпації, при натисканні з сосків виділяються крапельки молока. Яке медсестринське втручання потрібно виконати в першу чергу?

- A *Спорожнити молочні залози шляхом зціджування
- B Обмежити пиття
- C Імобілізувати молочні залози

D Компрес на молочні залози

E Ввести знеболюючий препарат

42

Медсестра готує вагітну до УЗД. Що доцільно провести для реалізації плану медсестринського втручання?

A *Провести роз'яснення в плані підготовки

B Виміряти АТ, Ps

C Обмеження гострої їжі

D Обмеження вживання рідини

E Провести бесіду з родичами

43

У післяпологовому відділенні медсестра проводить бесіду з породіллею. На які проблеми породіллі треба звернути увагу?

A *Скарги породіллі з боку статевих органів та молочних залоз

B Скарги породіллі на підвищену пітливість

C Скарги породіллі на підсилення апетиту

D Скарги породіллі на сонливість

E Скарги породіллі на відчуття спраги

44

Першороділля 23-х років народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. Через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

A *Запропонувати роділлі потужитись

B Ввести в/в 1 мл окситоцину

C Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревічу

D Застосувати зовнішній прийом по Гентеру

E Провести ручне виділення посліду

45

У вагітної 35 років, в терміні вагітності 20 тижнів було зафіксовано патологічну прибавку у вазі. Яке обстеження необхідно провести для виявлення прихованіх набряків при підозрі прогестозу?

A *Проба Мак-Клюра-Олдріча

B Вимірювання артеріального тиску на обох руках

C Визначення білку в сечі

D Визначення сечовини та креатиніну

E УЗД

46

Ви проводите заняття в жіночій консультації з питань статевого здоров'я. Обговорюючи фази нормального менструального циклу, ви повідомите про зміни, що відбуваються в яєчниках під час овуляції, а саме:

A *Розрив фолікула і вихід яйцеклітини

B Утворення жовтого тіла менструації

C Продуктування прогестерону

D Утворення жовтого тіла вагітності

E Створення умов для імплантації

47

Під час обстеження вагітної в терміні 36 тижнів Ви з'ясували, що поздовжня вісь плоду утворює з поздовжньою віссю матки прямий кут. Про яке положення плода іде мова?

A *Поперечне

B Коє

C Поздовжнє

D Лобне

E Тазове

48

Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте термін вагітності.

A *16 тижнів

B 12 тижнів

C 20тижнів

D 30 тижнів

E 36 тижнів

49

Ви медична сестра ЖК, приймаєте участь в організації заняття з безпечноного материнства та батьківства, та інформуєте слухачів про періоди пологів. Які періоди пологів ви знаєте?

A *Розкриття, зганяння, послідовий

B Прелімінарний, розкриття, послідовий

C Прелімінарний, зганяння, послідовий

D Провісники, розкриття, зганяння

E Розкриття, зганяння, післяпологовий

50

При обстеженні жінки з терміном 24 тижні була запідозрена багатоплідна вагітність. Який метод обстеження підтверджить багатопліддя?

A *Вислуховування серцебиття плода в двох пунктах

B Вимірювання ОЖ і ВДМ

C Вимірювання пульсу і АТ жінки

D вислуховування серцебиття в одному пункті

E вимірювання розмірів тазу

51

Породілля 25 років перебуває у індивідуальній пологовій палаті. Друга доба післяполового періоду. Які показники будуть засвідчувати про фізіологічний перебіг цього періоду?

A * AT – 120/75 мм рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,7°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисти

B AT - 100/60 мм рт.ст., пульс – 80 уд./хв., t – 37,8°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисто-слизові

C AT – 110/60 мм рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки вище пупка, розм'якшена, лохії кров'янисти

D AT – 125/85 мм рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки нижче пупка, лохії слизові

E AT – 120/75 мм рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки за лоном, лохії кров'янисти

52

Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку.

Серцебиття плода – 140 уд./хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на рівні пупка справа. За допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра може визначити положення та позицію плода?

A *I-го і II-го прийомів Леопольда-Левицького

B III-го прийому Леопольда-Левицького

C I-го прийому Леопольда-Левицького

D III-го і IV-го прийомів Леопольда-Левицького

E IV-го прийому Леопольда-Левицького

53

В реєстратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої консультації, пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?

- A *Індивідуальну карту вагітної і роділлі
- B Контрольну карту диспансерного обліку
- C Журнал обліку вагітності
- D Медичну картку амбулаторного хворого
- E Історію пологів

54

В ранньому післяпологовому періоді за призначенням лікаря медсестра внутрішньом'язово ввела породіллі 1мл (5 ОД) окситоцину. Що буде критерієм оцінки результатів медсестринського втручання?

- A *Підвищення тонусу матки
- B Підвищення артеріального тиску
- C Зниження тонусу матки
- D Прискорення пульсу
- E Зниження артеріального тиску

55

Ви медсестра жіночої консультації, у обов'язки якої входить патронаж породіль. Скільки часу триває післяпологовий період?

- A *6-8 тижнів
- B 4-5 тижнів
- C 2-3 тижні
- D 1 місяць
- E 1 рік

56

Роділля 26 років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12 годин тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв. Серцебиття плода 140 уд./хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена, розкриття 4 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малій таз. Про яке ускладнення пологів йде мова?

- A *Первинна слабкість пологової діяльності
- B Дискоординована пологова діяльність
- C Надмірно сильна пологова діяльність
- D Вторинна слабкість пологової діяльності
- E Загроза розриву матки

57

Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів?

- A *Наявність регулярних перейм
- B Наявність нерегулярних перейм
- C Відходження навколоподібних вод
- D Відходження слизової пробки
- E Опущення дна матки

58

Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до ймовірних ознак вагітності?

- A Зміна величини, форми і консистенції матки
- B Зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку
- C Пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота

D Промацування частин плода

E Вислуховування серцебиття плода

59

У породіллі 20 років щойно народилась доношена дитина чоловічої статі. Необхідно провести профілактику офтальмії. Назвіть препарат за допомогою якого здійснюють таку профілактику?

A *1% тетрациклінова мазь

B Пеніцилін

C Преднізолон

D Фурацилін

E *2% олійний розчин хлорофіліпту

60

У роділлі III період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого підребір'я. Вкажіть ознаку відділення плаценти.

A *Шредера

B Альфельда

C Довженка

D Чукалова-Кюстнера

E Абуладзе

61

У першовагітної жінки 24 років терміном 38 – 39 тижнів, з'явився переймоподібний біль внизу живота і попереку по 15-20 секунд через 1-2 години. Як оцінити такі симптоми?

A *Прелімінарний період

B Перший період пологів

C Третій період пологів

D Післяпологовий період

E Другий період пологів

62

У роділлі К, 25 р. при піхвовому обстеженні шийка матки згладжена, розкриття 4 см; плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці. Вкажіть період пологів.

A *I період пологів

B II період пологів

C Провісники пологів

D III період пологів

E Післяпологовий період

63

На прийом у жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на поганий апетит, нудоту, припинення менструації протягом 2 місяців. Який метод дослідження необхідно провести для виявлення вагітності?

A *Огляд в дзеркалах на гінекологічному кріслі

B Вимірювання розмірів тазу

C Вимірювання висоти стояння дна матки

D Вимірювання окружності живота

E Вимірювання індексу Соловйова

64

Медична сестра при огляді вагітної жінки визначає розташування плода у порожнині матки. Для цього вона застосовує:

A *Прийоми Леопольда

B Вимірювання розмірів тазу

C Аускультацію плода

D Перкусію живота

E Вагінальне дослідження

65

Вагітна цікавиться у медичної сестри про термін пологів, якщо перший день останньої менструації був 10.05. Медична сестра визначила очікувану дату пологів:

A *17.02

B 10.03

C 29.03

D 20.04

E 27.05

66

Породілля, 23 роки, знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки перебуває на рівні пупка, лохії кров'янисті. Якій добі післяпологового періоду відповідають ці симптоми?

A *1-2-й добі

B 3-4-й добі

C 5-6-й добі

D 7-8-й добі

E 10-й добі

67

У пологовий будинок доставлено першороділлю 23 років у тяжкому непритомному стані. Зі слів чоловіка, у дружини з'явилися: головний біль, біль у надчревній ділянці, було блювання, потім почався судомний напад з втратою свідомості. При госпіталізації: свідомість відсутня, обличчя одутле, бліде, повіки набряклі, АТ – 160/100 мм рт.ст. Яка дійсна проблема пацієнтки?

A *Судомний напад

B Біль голови

C Блювання

D Одутле обличчя

E Гіпертензія

68

Після народження дитини необхідно провести профілактику офтальмії. Який препарат повинна підготувати медсестра?

A *Мазь тетрациклінову

B Розчин фурацилліну

C Розчин йодонату

D Розчин сульфацилу натрію

E Мазь ністатинову

69

Жінка 24р., звернулася в жіночу консультацію із скаргами на відсутність менструації (остання була 5 місяців тому). Які ознаки є достовірними для встановлення вагітності?

A *Визначення частин плоду

B Зміна смаку

C Пігментація шкіри обличчя

D Припинення менструації

E Збільшення матки

70

У жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, блювоту вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження застосувати для підтвердження вагітності?

A *Дворучне піхвове дослідження

B Чотири прийоми Леопольда

C Визначення ВСДМ

D Аналіз крові

E Зважування жінки