

Крок М Сестринська справа
Медсестринство в інших дисциплінах хірургічного профілю

1

До очного центру звернувся пацієнт з травмою лівого ока. Лікар встановив діагноз - проникаюче поранення лівого ока. Яку пов'язку накладе медична сестра?

- A** *Асептичну біокулярну
- B** Асептичну монокулярну
- C** Колову
- D** Монокулярну лейкопластирну
- E** Косинкову

2

До травм пункту звернувся пацієнт, у якого різана рана гомілки. Після проведення ПХО рани лікар призначив щеплення проти правцю. Яку потенційну проблему попередив лікар?

- A** *Захворювання на правець
- B** Виникнення сепсису
- C** Захворювання на сказ
- D** Виникнення тромбозу
- E** Захворювання на бешиху

3

Пацієнтка звернулася до мамолога зі скаргами на наявність новоутворення в молочній залозі. Який метод з перелічених встановлює діагноз злоякісної пухлини?

- A** *Цитологічне дослідження
- B** Ендоскопічне обстеження
- C** Ехографія
- D** Комп'ютерна томографія
- E** Лабораторні дослідження

4

У пацієнта 50 років лімфогранулематоз. Проходить курс хіміотерапії. Скаржитися медичній сестрі на безсоння, головний біль, нудоту, блювання. Яка її тактика в даній ситуації?

- A** *Повідомити лікаря
- B** Дати протиблювотне
- C** Запропонувати снодійне
- D** Порекомендувати дотримуватися дієти
- E** Застосувати знеболювальне

5

Пацієнт 63 років викликав швидку допомогу у зв'язку зі скаргами на сильний різкий біль у поперековій ділянці справа з іррадіацією в зовнішні статеві органи, часте болісне сечовиділення. З анамнезу: хворіє на нирковокам'яну хворобу. Яке незалежно сестринське втручання виконає медсестра?

- A** *Тепла грілка на поперекову ділянку
- B** Зігрівальний компрес
- C** Банки
- D** Міхур з льодом
- E** Гірчичники

6

Пацієнт 70 років звернувся до лікаря зі скаргами на часте сечовиділення вночі, часті термінові позиви, утруднення при сечовиділенні. Після обстеження лікар встановив діагноз: "Аденома передміхурової залози II-A". Яка пріоритетна потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A** *Гостра затримка сечі
- B** Нетримання сечі

- C* Зміна кольору сечі
- D* Розлади діурезу
- E* Хронічна ниркова недостатність

7

У пацієнта рак легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Яке незалежне втручання виконає медична сестра?

- A* *Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B* Покласти гірчичники на грудну клітку
- C* Поставити банки
- D* Зробити масаж грудної клітки
- E* Зігріваючий компрес

8

Медична сестра супроводжує пацієнта на рентгенологічне дослідження шлунку. Діагностовано – рак. Пацієнт запитує про результати дослідження. Що відповість пацієнту медична сестра?

- A* *Порадить звернутися до лікаря
- B* Скаже справжній діагноз
- C* Промовчить
- D* Заспокоїть хворого
- E* Скаже неправдивий діагноз

9

Хворий у коматозному стані, дихає через трахеостому. Чергова медсестра реанімаційного відділення помітила, що дихання в нього стало частішим, з'явився ціаноз шкіри. Яке незалежне втручання може виконати медична сестра?

- A* *Перевірити прохідність трахеостомічної трубки
- B* Ввести спазмолітики
- C* Попередити западання язика
- D* Ввести серцеві засоби
- E* Налagodити інгаляцію зволоженого кисню

10

Назвіть основний клінічний симптом пухлин м'яких тканин.

- A* *"Плюс - тканини"
- B* Больовий
- C* Загальних ознак
- D* Інтотоксикації
- E* Анемічний

11

Яка проблема може виникнути при видаленні сірчаної пробки із зовнішнього слухового ходу методом промивання?

- A* *Втрата рівноваги
- B* Отогенний сепсис
- C* Отогенний менінгіт
- D* Абсцес мозку та мозочка
- E* Синустромбоз

12

У хворої 42 років виставлено діагноз: рак молочної залози III стадії. Який основний метод лікування?

- A* *Комплексний
- B* Хірургічний
- C* Хіміотерапія

- D** Гормонотерапія
- E** Променевиий

13

Медичній сестрі очного відділення хворий скаржиться на біль та відчуття стороннього тіла у оці, спостерігається закисання очей. Яку хворобу можливо запідозрити?

- A** *Кон'юктивіт
- B** Кератит
- C** Блефарит
- D** Ірит
- E** Катаракту

14

До медичної сестри хірургічного кабінету звернулась сусідка зі скаргами на локальний біль в ділянці шлунка. З часом біль став інтенсивним. Медична сестра, при проведенні сестринського обстеження хворої, виявила додаткові скарги на нудоту, зниження апетиту та схуднення. Що порекомендує медична сестра пацієнтці?

- A** *Негайно звернутися до онколога або хірурга
- B** Вживати знеболюючі засоби
- C** Вживати таблетки церукалу
- D** Дотримуватися дієти
- E** Пройти ультразвукове обстеження шлунка

15

В гастроентерологічне відділення поступив хворий зі скаргами на слабкість, нездужання, підвищення температури тіла до 37,6°C, печію в епігастрії, відразу до м'ясної їжі. За останні пів року схуд на 8 кг. Про яке захворювання подумає медична сестра?

- A** *Рак шлунку
- B** Хронічний гастрит
- C** Виразкова хвороба шлунку
- D** Хронічний езофагіт
- E** Хронічний панкреатит

16

Чоловік звернувся до лікувального закладу зі скаргами на болючу припухлість верхньої повіки лівого ока. Об-но: на обмежаній ділянці краю верхньої повіки, припухлість, яка має жовтуватий колір, на вершині пустула, по периферії гіперемія, набряк. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A** *Ячмінь
- B** Халязіон
- C** Абсцес
- D** Флегмона
- E** Алергічний набряк

17

Яке можливе ускладнення при варикозному розширенні вен:

- A** *Трофічна виразка
- B** Правець
- C** Кардіогенний шок
- D** Печінкова колька
- E** Парези

18

Визначення меж поля зору проводять за допомогою:

- A** *Периметра
- B** ТонOMETра Маклакова

- C* Офтальмоскопа
- D* Таблиці Головіна-Сівцева
- E* Щілинної лампи

19

Після введення анестетика в перидуральний простір пацієнту надають положення:

- A* *З піднятим головним кінцем
- B* Горизонтальне
- C* З опущеним головним кінцем
- D* На спині
- E* На животі

20

Пальцеве дослідження носоглотки проводиться для діагностики:

- A* *Аденоїдів
- B* Гострого тонзиліту
- C* Гострого фарингіту
- D* Гострого гаймориту
- E* Хронічного тонзиліту

21

У хворого 45 років після потрапляння води у вухо раптово погіршився слух, з'явився шум у вусі, відчуття розпирання, аутофонія. Назвіть пріоритетну проблему пацієнта?

- A* *Сірчана пробка
- B* Гострий отит зовнішнього вуха
- C* Стороннє тіло зовнішнього слухового ходу
- D* Гострий середній катаральний отит
- E* Гострий середній гнійний отит

22

У пацієнтки 17 років родинка в області гомілки темного кольору, після травматизації почала збільшуватись, мокнути, інколи кровоточити. Больових відчуттів немає. Що Ви порекомендуєте пацієнтці?

- A* *Звернутись до онколога
- B* Змазувати 1% розчином йодонату
- C* Звернутись до хірурга
- D* Робити пов'язки з левосином
- E* Звернутись до дерматолога

23

Пацієнт 73 років знаходиться на лікуванні в урологічному відділенні. Самостійно рухається, здійснює самодогляд, але не може мочитися. Сечовипускання здійснюється через постійний катетер. Яку фізіологічну проблему на II етапі медсестринського процесу повинна виявити медсестра у пацієнта?

- A* *Ризик розвитку інфекції сечових шляхів
- B* Неможливість самостійно рухатися
- C* Неадекватна рухова активність
- D* Страх перед нетриманням сечі
- E* Ризик утворення пролежнів шкіри

24

Ви медична сестра урологічного відділення. Лікарем призначено провести промивання сечового міхура. Який антисептичний розчин необхідно підготувати?

- A* *Розчин фурациліну 1:5000
- B* 0,9% розчин хлориду натрію
- C* 3% розчин перекису водню

- D* 0,9% розчин хлориду натрію
- E* 0,9% розчин натрію гідрокарбонату

25

Серцево-легеневу реанімацію застосовують при термінальних станах, вкажіть один з них:

- A* *Клінічна смерть
- B* Агонія
- C* Предагонія
- D* Післяопераційний період
- E* "Соціальна смерть"

26

Ускладнення виразкової хвороби шлунку, що потребує негайної операції:

- A* *Перфорація виразки
- B* Субкомпенсований стеноз
- C* Некомпенсований стеноз
- D* Пенетрація виразки
- E* Шлунково-кишкова кровотеча

27

В анамнезі рана в ділянці стопи. Рана загоїлася, через деякий час у хворого виникло посмикування жувальних м'язів, судоми всього тіла, "сардонічна посмішка", опістотонус. Що з хворим?

- A* *Правець
- B* Інфікована рана
- C* Сказ
- D* Газова гангрена
- E* Гнилісна інфекція

28

В офтальмологічне відділення поступає пацієнт з ознаками гострого приступу глаукоми.

Медсестра повинна виконати наступні лікарські призначення:

- A* *Закапувати 1% пілокарпін кожні 15 хвилин впродовж години
- B* Закапати 1% атропін, 0,25% скополамін, 1% гоматропін
- C* Закапати 30% сульфацил натрію, 0,25% левоміцетин
- D* Закласти за повіку тетрациклінову або левоміцетинову мазь
- E* Закапати дексаметазон, дексазон або гідрокортизон

29

На прийомі в офтальмолога пацієнт з ознаками лусочкового блефариту. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу медсестра повинна:

- A* *Обробити краї повік діамантовим зеленим
- B* Обробити краї повік розчином дімедролу
- C* Обробити краї повік розчином анальгін
- D* Обробити краї повік розчином дексаметазону
- E* Обробити краї повік розчином атропіну

30

На прийомі в офтальмолога пацієнт з діагнозом зріла катаракта. При цьому медсестра встановлює наступний медсестринський діагноз:

- A* *Зниження гостроти зору
- B* Випадіння з поля зору
- C* Гнійні виділення з ока
- D* Біль ока, голови
- E* Звуження поля зору

31

Пацієнт, який впродовж 5 років працює на пилограмі, звернувся зі скаргами на зниження слуху, шум у вусі. Медсестра повинна підготувати пацієнта до:

- A** *Аудіометрії
- B** Отоскопії
- C** Діафаноскопії
- D** Рентгенографії вуха
- E** Вестибулометрії

32

Жінку доставлено у відділення реанімації з ознаками отруєння чадним газом. Пацієнтку терміново готують до проведення:

- A** *Гіпербаричної оксигенації
- B** Ентеросорбції
- C** Форсованого діурезу
- D** Гемосорбції
- E** Плазмаферезу

33

Після випадкового вживання невідомої рідини пацієнт скаржиться на біль в животі та гомілкових м'язах, порушення зору, блювання. Артеріальний тиск знижений, розвивається гіпертонус м'язів. Такі симптоми характерні для отруєння:

- A** *Метанолом
- B** Етанолом
- C** Опіатами
- D** Фосфорорганічними сполуками
- E** Ацетатною кислотою

34

До лікаря звернулася пацієнтка зі скаргами на виділення крові із соска при натисканні на праву молочну залозу. До якого обстеження з метою уточнення діагнозу медична сестра підготує пацієнтку?

- A** *Мамографії
- B** Томографії
- C** Сцинтиграфії
- D** Ангіографії
- E** Сонографії

35

Ефективність зовнішнього масажу серця по пульсу на сонній артерії потрібно перевіряти кожних:

- A** *2 хв.
- B** 3 хв.
- C** 5 хв.
- D** 8 хв.
- E** 10 хв.

36

Невідкладна допомога при нирковій колиці.

- A** *Введення баралгіну
- B** Холод на попереk
- C** Назначення діуретиків
- D** Введення натрію хлориду
- E** Введення глюкозидів

37

Найбільш інформативний метод діагностики виразкової хвороби шлунка:

- A** *Фіброгастроскопія
- B** Рентгеноскопія
- C** Лапароскопія
- D** УЗД
- E** Сканування

38

Збільшення діастази сечі характерно для:

- A** *Гострого панкреатиту
- B** Гострого апендициту
- C** Защемленої грижі
- D** Проривної виразці шлунку
- E** Для інвагинації

39

У ЛОР-відділення поступив хворий з переломом кісток носа, носовою кровотечею. Які інструменти необхідно підготувати медичній сестрі?

- A** *Носове дзеркало, носові елеватори
- B** Кровозупинні затискачі, скальпель
- C** Пінцет, кровозупинні затискачі
- D** Шпатель, кровозупинні затискачі
- E** Корнцанг, роторозширювач

40

При гострій затримці сечі в післяопераційному періоді використовують:

- A** *Катетеризацію сечового міхура
- B** Холод на лоно
- C** Внутрішньовенно глюкозу
- D** Внутрішньовенно натрію хлорид 10%
- E** Внутрішньовенно еуфілін

41

Вкажіть співвідношення ШВЛ до закритого масажу серця при проведенні серцево-легеневої реанімації одним реаніматором.

- A** *2:15
- B** 2:12
- C** 1: 5
- D** 1:10
- E** 2:10

42

Можливі ускладнення при тромбофлебіті нижніх кінцівок.

- A** *Тромбоемболія
- B** Бешиха
- C** Слоновість
- D** Остеомієліт
- E** Періостит

43

Симптом "переміжної кульгавості" характерний для захворювання:

- A** *Облітеруючий ендартеріїт
- B** Флеботромбоз
- C** Флебит

- D* Ревматоїдний артрит
- E* Тромбофлебіт

44

Перша допомога при відкритому пневмотораксі:

- A* *Накладання оклюзійної пов'язки
- B* Дренаж по Суботіну
- C* Протикашлеві препарати
- D* Плевральна пункція
- E* Введення наркотиків

45

До передракових захворювань прямої кишки відноситься:

- A* *Поліпоз прямої кишки
- B* Парапроктит
- C* Хронічний коліт
- D* Сигмоїдит
- E* Випадіння прямої кишки

46

Що характерне для перфоративної виразки 12-палої кишки?

- A* *Раптовий "кинджальний біль"
- B* Оперізуючий біль
- C* Симптом Пастернацького
- D* Блювання "кавовою гущею"
- E* Метеоризм

47

Лікворея виникає при:

- A* *Переломі основи черепа
- B* Забої головного мозку
- C* Пораненні склепіння черепа
- D* Струсі головного мозку
- E* Здавленні головного мозку

48

Хворий скаржиться на біль в оці і відповідній половині голови, значне зниження зору, нудоту, блювання. Внутрішньоочний тиск 60 мм рт.ст. Відображена картина дозволяє запідозрити:

- A* *Гострий напад глаукоми
- B* Гострий іридоцикліт
- C* Повзучу виразку рогівки
- D* Метагерпетичний кератит
- E* Кератокон'юнктивіт

49

Хворий знаходиться на диспансерному обліку з приводу глаукоми. Яким методом можна визначити рівень внутрішньоочного тиску?

- A* *Тонометрії
- B* Візометрії
- C* Периметрії
- D* Кампіметрії
- E* Офтальмоскопії

50

У хворого проникаюче поранення ока. Профілактику якого захворювання Вам необхідно

- провести?
- A** *Правця
 - B** Чуми
 - C** Бешихи
 - D** Сифілісу
 - E** Токсоплазмозу

51

В комбустиологічне відділення привезли пацієнта з опіком IV ступеня. Виберіть ознаку, яка характеризує цей ступінь:

- A** *Обвуглення
- B** Еритема шкіри
- C** Некроз епідермісу
- D** Некроз дерми
- E** Наявність пухирів

52

Медична сестра поставила діагноз "синдром гострого живота". Яке захворювання може бути у пацієнта:

- A** *Перфоративна виразка шлунку
- B** Гастрит
- C** Ниркова колька
- D** Апендикулярний інфільтрат
- E** Гострий коліт

53

У пацієнта відкритий перелом, який супроводжується артеріальною кровотечею. Що медична сестра спочатку застосує:

- A** *Кровозупинний джгут Есмарха
- B** Асептичну пов'язку
- C** Транспортну іммобілізацію
- D** Кровозупинні засоби
- E** Знеболюючі

54

У хворого перелом ключиці без зміщення відламків. Яку пов'язку повина накласти медична сестра в даному випадку:

- A** *Дезо
- B** Колосоподібну
- C** Поворотну
- D** Спіральну
- E** Черепашачу

55

У хворого розтягнення зв'язок гомілково-ступневого суглоба. Яку пов'язку застосує медична сестра в даному випадку:

- A** *Хрестоподібну
- B** Черепашачу
- C** Зворотню
- D** Повзучу
- E** Колосовидну

56

Медичні сестри при масивних переливаннях крові проводять профілактику цитратного шоку пацієнтам. Що вони при цьому застосовують:

- A** *Розчин хлористого кальцію

- B** Нітрогліцерин
- C** Новокаїн
- D** Антибіотики
- E** Поліглюкін

57

Медична сестра спостерігає за вимірюванням центрального венозного тиску у хворого. Вкажіть нормальні показники цього дослідження:

- A** *30-60 мм вод.ст.
- B** 100-120 мм вод.ст.
- C** 10-20 мм вод.ст.
- D** 0-10 мм вод.ст.
- E** 200-220 мм вод.ст.

58

До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт 70 років зі скаргами на раптовий біль в ділянці пахової грижі, нудоту, блювання. При обстеженні грижа болісна, збільшена, напружена, не вправляється. Що у хворого:

- A** *Защемлення грижі
- B** Копростаз
- C** Кишкова непрохідність
- D** Невправимість грижі
- E** Малігнізація

59

Утопленого чоловіка 48 років доставили на берег через 6 хвилин після утоплення. Свідомість відсутня, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанімацію: ШВЛ методом "з рота в рот" і масаж серця. Яка з перелічених ознак вказує на ефективність реанімаційних заходів?

- A** *Звуження зіниць
- B** Підвищення артеріального тиску
- C** Прискорення пульсу
- D** Сповільнення пульсу, часте дихання
- E** Прискорення дихання