

Крок М Сестринська справа
6.2 Невідкладні стани в хуріргії

1

У хворого на пахвинну грижу 1 годину тому після підняття вантажу з'явився біль у ділянці грижового утворення і воно перестало вправлятися у черевну порожнину. Які заходи невідкладної допомоги повинна виконати медсестра?

- A** *Викликати “швидку допомогу”
- B** Ввести розчин анальгін у внутрішньом'язово
- C** Ввести розчин но-шпи внутрішньом'язово
- D** Спробувати самостійно вправити грижу
- E** Покласти грілку на ділянку грижі

2

Потерпілого чоловіка, 24 років, після ДТП до приймально-діагностичного відділення доставили з множинними ушкодженнями. Чергова медична сестра виявила, що пацієнт без свідомості, дихання поверхневе, пульс ниткоподібний, зіниці звужені. Першочергове незалежне медсестринське втручання.

- A** *Викликати лікаря
- B** Виміряти АТ
- C** Зібрати сечу на аналіз
- D** Транспортувати до рентгенкабінету
- E** Зняти ЕКГ

3

Медична сестра відділення реанімації та інтенсивної терапії за призначенням лікаря проводить інтенсивну медикаментозну терапію. Визначити найбільш ефективний шлях введення інфузійних засобів:

- A** *Внутрішньовенний
- B** Внутрішньом'язовий
- C** Підшкірний
- D** Внутрішньосерцевий
- E** Внутрішньоартеріальний

4

У жінки опік окропом передньої поверхні грудей, живота та ніг. Скарги на сильний біль. Шкіра гіперемована, набрякла. Яке сестринське втручання є доцільним на догоспітальному етапі?

- A** *Охолодити, накласти асептичну пов'язку
- B** Підсікти пухирі та накласти пов'язку
- C** Порадити застосувати грілку
- D** Накласти мазеву пов'язку
- E** Накласти оцтовий компрес

5

Чоловік в стані алкогольного сп'яніння випадково взяв в рот декілька мл оцтової кислоти. Турбує біль. Ротова порожнина гіперемована. Що в першу чергу повинна зробити медсестра?

- A** *Ретельно промити рот водою
- B** Дати випити гарячого молока
- C** Дати випити холодного молока
- D** Дати ковтати шматочки льоду
- E** Ввести в шлунок тонкий зонд.

6

Пацієнт отримав травму грудної клітки. Положення вимушене, у 4 міжребер'ї зліва різана рана 3x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Ви наклали окклюзійну пов'язку. Яке її функціональне призначення?

- A** *Герметизація рани
- B** Захист від інфікування
- C** Усунення деформації
- D** Зупинка кровотечі
- E** Транспортна іммобілізація

7

До Вас звернувся сусід, який скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, затримку газів і стільця. При огляді Ви запідозрили “гострий живіт”. Як надати долікарську допомогу?

- A** *Покласти холод на живіт, викликати “швидку допомогу”
- B** Знеболити, покласти грілку на живіт
- C** Промити шлунок, поставити очисну клізму
- D** Знеболити, спостерігати за пацієнтом протягом 3-х годин
- E** Обмежити прийом їжі та води, ввести спазмолітики

8

У потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ви виявили відсутність дихання, пульса на сонній артерії, широкі зіниці. Що в першу чергу треба зробити?

- A** *Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B** Дати вдихнути нашатирного спирту
- C** Викликати “швидку допомогу”
- D** Викликати міліцію
- E** Ввести хлористий кальцій

9

До медичної сестри звернувся пацієнт із забоем м'яких тканин. Який препарат із групи місцевих анестетиків необхідно використати для знеболення ділянки цієї травми шляхом охолодження?

- A** *Хлоретил
- B** Дикаїн
- C** Ефір
- D** Лідокаїн
- E** Новокаїн

10

У хворого з напруженим пневмотораксом з'явилися симптоми порушення гемодинаміки. Яка причина цього порушення?

- A** *Зміщення органів середостіння
- B** Гіповолемія
- C** Метаболічний ацидоз
- D** Метаболічний алкалоз
- E** Повітряна емболія

11

Назвіть показання до екстреної профілактики правця:

- A** *Позагоспітальні аборти
- B** Фурункул
- C** Бешиха
- D** Термічні опіки 1 ст
- E** Відмороження 1 ст

12

При падінні з висоти хворий отримав закритий перелом обох нижніх кінцівок в ділянці гомілок. Надайте невідкладну допомогу:

- A** *Накладання транспортних шин
- B** Накладання джгута
- C** Накладання скелетного витягу
- D** Накладання гіпсової пов'язки
- E** Накладання тиснучої пов'язки

13

При переливанні одногрупної, резус-сумісної крові у хворого з'явилися скарги на біль у поперековій ділянці, важкість при диханні, серцебиття, біль за грудиною. Ваші дії:

- A** *Припинити переливання крові, викликати лікаря
- B** Припинити переливання крові, ввести 50% 2 мл анальгін
- C** Припинити переливання крові, дати таблетку валідолу під язик
- D** Припинити переливання крові, спостерігати за хворим
- E** Заспокоїти хворого і продовжити переливання крові

14

До лікаря звернувся хворий з різаною раною передньої поверхні передпліччя, з якої витікає темно-червона кров. Що повинна виконати медична сестра за призначенням лікаря для тимчасової зупинки кровотечі?

- A** *Накладання давлучої пов'язки
- B** Згинання кінцівки в суглобі
- C** Накладання артеріального джгута
- D** Накладання затискача
- E** Електрокоагуляція

15

Дві хвилини тому електрик отримав удар електричним струмом. Хворий непритомний, пульс над сонною артерією не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло. Ваші дії:

- A** *Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B** Дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом
- C** Розпочати непрямий масаж серця
- D** Ввести в/в 1% розчин адреналіну
- E** Чекати на прибуття реанімаційної бригади

16

Ознакою перфорації виразки шлунка вважається:

- A** *Раптовий кинджальний біль в животі
- B** Симптом Ортнера
- C** Метеоризм
- D** Підвищення температури тіла

17

Вы медсестра здравпункта. Вас вызвали к пострадавшему с проникающим ранением грудной клетки. Состояние больного тяжелое. При осмотре из раны выделяется пенная кровь. Какой тип повязки запланирует медсестра для оказания первой медицинской помощи?

- A* *Оклюзионную
- B* Спиральную
- C* Давящую
- D* Черепашью
- E* Косыночную

18

Яке найбільш небезпечне ускладнення може виникнути при кровотечі з яремних вен шиї?

- A* *Повітряна емболія
- B* Травматичний шок
- C* Велика крововтрата
- D* Падіння артеріального тиску
- E* Виникнення тромбів

19

Робітник підприємства одержав електротравму, тримає дрот в руці. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра:

- A* *Звільнити потерпілого від джерела електроструму
- B* Ввести знеболюючі препарати
- C* Провести штучну вентиляцію легенів
- D* Провести закритий масаж серця
- E* Викликати бригаду швидкої медичної допомоги

20

Ви оглядаєте потерпілого з вогнепальною раною правого стегна. Локально: в рані видно осколки стегнової кістки, рана кровоточить пульсуючим струменем. Ваші першочергові дії:

- A* *Накласти джгут
- B* Накласти асептичну пов'язку
- C* Ввести знеболюючі
- D* Транспортувати потерпілого в найближчу лікарню
- E* Провести транспортну іммобілізацію підручними засобами

21

У чоловіка 70 років Ви діагностували гостру затримку сечі. Виберіть першочергові дії медичної сестри при наданні невідкладної допомоги хворому:

- A* *Катетеризація гумовим катетером.
- B* Катетеризація металевим катетером.
- C* Надлобкова пункція сечового міхура.
- D* Епіцистостомія.
- E* Аденомектомія.

22

На травмпункт доставлений чоловік 28 років. Сам сказати нічого не може, рот широко

відкритий, нижня щелепа висунута вперед. Відмічається слинотеча. Травму отримав під час бійки. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A** *Вивих нижньої щелепи.
- B** Перелом нижньої щелепи.
- C** Перелом верхньої щелепи.
- D** Остеомієліт нижньої щелепи.
- E** Остеома нижньої щелепи.

23

Чоловік 45 років звернувся за медичною допомогою. Скаржиться на біль правій паховій ділянці, який з'явився раптово після фізичного навантаження. Рік тому у хворого діагностовано правобічну пахову килу. При огляді у правій паховій ділянці є різкоболюче випинання, яке невправляється в черевну порожнину. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A** *Защемлення пахової кили
- B** Запалення килових оболонок
- C** Гострий апендицит
- D** Евентрація
- E** Копростаз

24

До якого основного обстеження треба підготувати пацієнта при підозрі на гостру кишкову непрохідність?

- A** *Рентгенологічне обстеження черевної порожнини
- B** Аналіз крові, сечі
- C** УЗД черевної порожнини
- D** Радіоізотопне черевної порожнини
- E** Колоноскопія, ректороманоскопія

25

Яку першу медичну допомогу надасть медсестра при закритій травмі живота з ушкодженням внутрішніх органів?

- A** *Холод на живіт, екстрена госпіталізація
- B** Фізіотерапевтичне лікування
- C** Грілку на живіт
- D** Знеболювання
- E** Підготовка до обстеження

26

В здоров'я пункті чоловіку 50 років встановлено діагноз: правостороння защемлена пахова грижа. Які дії медсестри є першочерговими на догоспітальному етапі?

- A** *Негайно викликати швидку допомогу, холод на живіт
- B** Дати но-шпу
- C** Дати анальгін
- D** Покласти холод на живіт
- E** Покласти грілку на живіт

27

У хірургічному відділенні пацієнту 50 років з виразковою хворобою шлунку, ускладненою кровотечею, проведено гемотрансфузію. Яке лабораторне обстеження необхідно планувати на наступний день?

- A** *Клінічний аналіз крові і сечі

- B** Аналіз крові на цукор
- C** Пробу за Зимницьким
- D** Коагулограму
- E** Аналіз крові на RW

28

До приймального відділення швидка допомога привезла постраждалого без свідомості.
Об'єктивно: кровотеча з вух та носу, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4х3 см.

До якого відділення слід направити пацієнта?

- A** *Нейрохірургічного
- B** Неврологічного
- C** Хірургічного
- D** Терапевтичного
- E** Діагностичного