

Крок М Сестринська справа
6.4 Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

1

У вагітної в терміні вагітності 36 тижнів, що знаходиться у відділенні патології вагітних, з'явився різкий біль унизу живота, рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Якою повинна бути першочергова дія медичної сестри?

- A** *Заспокоїти вагітну, викликати лікаря
- B** Ввести знеболюючі засоби
- C** Ввести кровозупинні препарати
- D** Провести тампонаду піхви
- E** Ввести засоби для скорочення матки

2

В гінекологічне відділення доставлена жінка 45 років зі скаргами на значні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. До якої маніпуляції медична сестра повинна підготувати інструменти:

- A** *Вишкрібання стінок порожнини матки
- B** Пункції черевної порожнини через заднє склепіння
- C** Кульдоскопії
- D** Біопсії шийки матки
- E** Цитологічного дослідження шийки матки

3

До медичної сестри звернулася мати з дитиною, яка отримала травму зовнішніх статевих органів на дитячому майданчику. Які першочергові дії медичної сестри?

- A** *Прикласти холод, викликати лікаря
- B** Ввести заспокійливі засоби
- C** Ввести кровозупинні засоби
- D** Ввести спазмолітики
- E** Ввести знеболюючі

4

В гінекологічне відділення поступила жінка 25 років з ознаками гострого живота. Остання менструація - два тижні тому. Ці дані дозволяють запідозрити:

- A** *Апоплексію яєчника
- B** Позаматкову вагітність
- C** Некроз фіброматозного вузла
- D** Сальпінгофорит
- E** Ерозію шийки матки

5

У породіллі М. після народження посліду почалася кровотеча. Під час огляду посліду на цілісність на плодовій оболонці була виявлена обірвана судина. М'які тканинипологових шляхів не ушкоджені. Яка найбільш імовірна причина кровотечі?

- A** Затримка додаткової дольки у порожнині матки
- B** Коагулопатична кровотеча
- C** Затримка плідних оболонок у порожнині матки
- D** Гіпотонічна маткова кровотеча
- E** Розрив шийки матки

6

У вагітної Н., 30 років, у терміні вагітності 30 тижнів, з'явилися помірні, безболісні, кров'янисті виділення з піхви. Які дії медсестри на долікарському етапі надання медичної допомоги?

- A** *Терміново госпіталізувати
- B** Провести піхвове обстеження
- C** Виміряти АТ, пульс
- D** Ввести кровоспинні
- E** Ввести токолітики

7

Пацієнтка 28 років, скаржиться на різкий раптовий біль у здухвинній ділянці праворуч, з ірадіацією у пряму кишку та крижі. Біль супроводжувався короточасною втратою свідомості. Затримка менструації 4 тижні. Жінка різко бліда, АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв., слабого наповнення. Симптом Щьоткіна-Блюмберга позитивний. Які першочергові дії медичної сестри?

- A** *Негайно викликати лікаря
- B** Визначити групу крові
- C** Ввести кровоспинні
- D** Визначити резус-належність
- E** Ввести кровозамінники

8

Пацієнтка 18 років, поступила в гінекологічне відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Який метод обстеження для підтвердження діагнозу необхідно застосувати?

- A** *Пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви
- B** Біопсія
- C** Взяття мазка на кольпоцитологію
- D** Гістеросальпінгографія
- E** Кольпоскопія

9

У пацієнтки 60 років виникла маткова кровотеча. Яку долікарську допомогу повинна надати медична сестра?

- A** *Холод на низ живота і госпіталізація
- B** Введення вікасолу та госпіталізація
- C** Введення окситоцину та госпіталізація
- D** Введення естрогенів та госпіталізація
- E** Провести вишкрібання порожнини матки

10

У роділлі І період пологів. Передбачувана маса плода - 4500,0. Перейми різко болючі, матка у вигляді "піщаного годинника". Роділля занепокоєна. Яку патологію можна запідозрити?

- A** *Загроза розриву матки
- B** Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- C** Передлежання плаценти
- D** Розрив шийки матки
- E** Розрив матки, що відбувся

11

У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом з втратою свідомості. Що є першочерговим при наданні долікарської допомоги?

- A** *Звільнити дихальні шляхи, зафіксувати язик

- B** Ввести гіпотензивні препарати
- C** Ввести знеболюючі засоби
- D** Ввести утеротоніки
- E** Ввести еуфілін

12

Пацієнтка 25 років поступила в гінекологічне відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Об'єктивно: помітне здуття живота, притуплення перкуторного звуку в бокових відділах, різка болючість при пальпації живота, наявний симптом Щоткіна-Блюмберга. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- A** *Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- B** Бімануальне дослідження
- C** Зовнішнє акушерське обстеження
- D** Огляд в дзеркалах
- E** Ренгенопельвіографія

13

Беременная находится в палате интенсивной терапии с диагнозом: “преэклампсия III степени”. Укажите приоритетную проблему позднего гестоза:

- A** *Судороги
- B** Повышение температуры тела
- C** Учащение мочеиспускания
- D** Кашель
- E** Кровянистые выделения из половых путей

14

У беременной со сроком беременности 36-37 недель появилось значительное безболезненное кровотечение из половых путей. При осмотре АД- 100/60 мм рт.ст., слабость, головокружение, пульс - 90/мин., слабого наполнения. Какая приоритетная проблема пациентки?

- A** *Кровотечение из половых путей
- B** Слабость
- C** Головокружение
- D** Гипотония
- E** Тахикардия

15

Какое независимое сестринское вмешательство выполнит медсестра в случае возникновения ювенильного кровотечения?

- A** *Холод на низ живота
- B** Выскабливание полости матки
- C** Введение гормональных средств
- D** Введение антибиотиков
- E** Введение кровоостанавливающих средств

16

К медсестре обратилась соседка с жалобами на обильные кровянистые выделения из половых путей. Женщина находится на “Д” учете в женской консультации по поводу миомы матки. Действие медсестры в данном случае:

- A** *Пузырь со льдом на низ живота, вызвать скорую помощь
- B** Рекомендовать постельный режим
- C** Наблюдать за состоянием женщины

- D** Применить кровеостанавливающие средства
- E** Применить сокращающие матку средства

17

У женщины, которая находится на учёте в женской консультации по поводу кисты яичника, после резкого движения появилась кинжальная боль внизу живота, тошнота. При осмотре: кожные покровы бледные, живот вздут, симптом Щеткина-Блюмберга положительный. Возникновение этого состояния связано с:

- A** *Перекрутом ножки кисты
- B** Увеличением кисты
- C** Малегнизацией кисты
- D** Рассасыванием кисты
- E** Уменьшением кисты

18

До жіночої консультації звернулась жінка зі скаргами на періодичний переймоподібний біль у здухвинній ділянці, затримку менструацій. При проведенні бімануального дослідження з'явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина?

- A** *Порушена позаматкова вагітність
- B** Апоплексія яєчника
- C** Прогресуюча позаматкова вагітність
- D** Перекрут ніжки кісти
- E** Розрив піосальпінкса

19

У роділлі розвинувся напад судом. В анамнезі - гестоз II половини вагітності Яку невідкладну допомогу потрібно їй надати?

- A** Ввести роторозширювач, язикотримачем зафіксувати язик, викликати лікаря
- B** Заспокоїти роділлю, викликати лікаря
- C** Ввести анальгетики
- D** Дати кисень
- E** Ввести гіпотензивні препарати

20

Ви медична сестра гінекологічного відділення. У жінки після штучного абортів виникла маткова кровотеча. Ваші дії:

- A** *Негайно викликати лікаря
- B** Спостерігати за хворою
- C** Ввести кровозупинні
- D** Покласти холод
- E** Заспокоїти пацієнтку

21

Ви медична сестра. До вас звернулась жінка з переймоподібним болем унизу живота, незначними кров'янистими виділеннями зі статевих шляхів. В анаменезі - затримка менструації 3 тижні. Ваші дії:

- A** *Негайно госпіталізувати пацієнтку
- B** Ввести знеболювальні засоби
- C** Спостерігати за пацієнткою
- D** Використати грілку, компреси

E Заспокоїти пацієнтку

22

У вагітної жінки в терміні 32 тижні вагітності з'явився біль в животі та кров'янисті виділення з піхви. Вкажіть першочергові дії медичної сестри:

- A* *Викликати акушерську бригаду
- B* Ввести заспокійливі засоби
- C* Ввести знеболюючі засоби
- D* Ввести кровозупинні засоби
- E* Визначити групу крові

23

При активному патронажі вагітної 34 тижнів вагітності медсестра визначила: АТ- 175/115 мм рт.ст., набряки на гомілкях і стегнах, протеїнурія. Ваші дії:

- A* *Негайно госпіталізувати
- B* Рекомендувати звернутися в жіночу консультацію
- C* Заспокоїти жінку
- D* Рекомендувати постільний режим
- E* Звернутися до терапевта

24

До гінекологічного відділення машиною швидкої допомоги доставлена хвора з підозрою на внутрішньочеревну кровотечу. Вкажіть першочергові дії медсестри:

- A* *Негайно викликати лікаря
- B* Розпочати ШВЛ
- C* Ввести кровозупинні засоби
- D* Розпочати інфузійну терапію
- E* Визначити групу крові та резус-фактор

25

В гінекологічне відділення поступила пацієнтка 25 років, з другою вагітністю в терміні 10 тижнів. Скаржиться на переймоподібний біль внизу живота і піхвову кровотечу. Яка тактика медичної сестри повинна бути в даному випадку?

- A* *Негайно викликати лікаря
- B* Введення кровоспинних засобів
- C* Введення знеболюючих засобів
- D* Введення спазмолітичних засобів
- E* Введення антибіотиків

26

Пацієнтка 33 роки, доставлена у гінекологічне відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. До якого дослідження необхідно підготувати інструменти, щоб уточнити діагноз?

- A* *Пункції черевної порожнини через заднє склепіння
- B* Діагностичного вишкрібання порожнини матки
- C* Біопсії
- D* Для цитологічного дослідження
- E* Для гормональної кольпоцитодіагностики

27

В приймальне відділення пологового будинку доставлена роділля в терміні вагітності 40

тижнів, зі статевої щілини звисає ручка плода, ціанотична, набрякла. Об'єктивно: виявлено симптоми загрозового розриву матки. Які дії медсестри в даному випадку?

- A** *Викликати лікаря
- B** Ввести спазмолітики
- C** Ввести скорочуючі засоби
- D** Заправити ручку у піхву
- E** Вислухати серцебиття плода та викликати лікаря

28

В гінекологічне відділення доставлено жінку 33 років, яка напередодні отримала травму зовнішніх статевих органів. Жінка скаржиться на розпираючий біль у ділянці травми. При огляді зовнішніх статевих органів виявлено: гематома, підшкірні крововиливи. Яку першу допомогу повинна надати медсестра?

- A** *Покласти міхур з льодом та викликати лікаря
- B** Провести тампонаду піхви
- C** Накласти шви на пошкоджені тканини
- D** Ввести кровозупинні засоби та викликати лікаря
- E** Ввести знеболюючі та продовжувати спостереження.

29

На диспансерному обліку знаходиться жінка 53 років з діагнозом раку шийки матки IV ступеню. Патронажна сестра під час відвідування хворої на дому виявила кровотечу зі статевих шляхів. Назвіть першу допомогу, яку повинна надати медсестра?

- A** *Провести тугу тампонаду піхви
- B** Ввести скорочувальні засоби
- C** Покласти міхур з льодом
- D** Ввести кровозамінники
- E** Розпочати інфузійну терапію

30

У гінекологічне відділення звернулась жінка 22 років зі скаргами на гострий біль внизу живота, короткочасне запаморочення. Затримка менструації до 7 тиж. Пацієнтка бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- A** *Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- B** Роздільне діагностичне вишкрібання тіла матки
- C** Зондування порожнини матки
- D** Біопсія шийки матки
- E** Вимірювання базальної температури

31

У пацієнтки репродуктивного віку виникла дисфункційна маткова кровотеча. Пріоритетною дією медсестри при наданні невідкладної допомоги в стаціонарі буде підготовка набору інструментів до:

- A** *Роздільного діагностичного вишкрібання
- B** Пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви
- C** Біопсії шийки матки
- D** Зондування порожнини матки
- E** Визначення прохідності маткових труб

32

Роділля 25 років, поступила в пологовий будинок з надмірно сильною пологовою діяльністю. При зовнішньому акушерському обстеженні виявлено: нижній сегмент матки перерозтягнутий, болючий при пальпації, контракційне кільце на рівні пупка, матка має вигляд "пісочного годинника". Які першочергові дії медичної сестри?

- A** *Викликати лікаря
- B** Заспокоїти пацієнтку
- C** Виконувати призначення лікаря
- D** Припинити пологову діяльність
- E** Підготувати пацієнтку до ургентної операції

33

У пологовий будинок поступила вагітна з поперечним положенням плода в терміні 38 тижнів. Який найвірогідніший метод родорозршення?

- A** *Кесарів розтин
- B** Накладання акушерських щипців
- C** Витягування плода за тазовий кінець
- D** Пологи через природні шляхи
- E** Плродоруйнівна операція

34

У роділлі К., через 20 хвилин після народження дитини з'явилися інтенсивні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Ознак відокремлення плаценти немає. Що слід зробити в першу чергу в даному випадку?

- A** *Ручне відділення та видалення плаценти
- B** Підготувати жінку до негайної лапаротомії
- C** Підготувати до екстирпації матки без додатків
- D** Підготувати до екстирпації матки з додатками
- E** Підготувати до ампутації матки

35

Вагітна М., 31-32 тижні вагітності, поступила зі скаргами на появу безболісної кровотечі зі статевих шляхів. Об'єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок, матка в нормотонусі. АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 86/хв. Кровотеча із статевих шляхів. При УЗД - край плаценти перекриває внутрішнє вічко. Клінічна картина характерна для:

- A** *Передлежання плаценти
- B** Самовільного викидня
- C** Загрози передчасних пологів
- D** Відшарування плаценти
- E** Раку шийки матки

36

Вагітна, 36 тижнів, скаржиться на кров'янисті виділення із статевих органів. Об'єктивно: передлежить голівка, розміщена високо над входом у малий таз. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 146/хв. За даними УЗД, плацента розміщена попереду передлеглої голівки плода. Який із заходів доклінічної допомоги необхідно провести в першу чергу?

- A** *Негайно викликати лікарську акушерську бригаду
- B** Провести інгаляцію кисню
- C** Ввести утеротонічні засоби
- D** Визначити групу крові
- E** Транспортувати в пологовий будинок